

Soins de protection des plantes en juillet dans les vignobles

Автор(и): гл.експерт Татяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ

Дата: 06.07.2017 Брой: 7/2017



Durant cette période, les vignes se trouvent dans le stade phénologique allant de la « fin de la floraison » à la « début de la maturation des baies » pour les cépages précoces.

Principaux ravageurs pour la période

Mildiou de la vigne *Plasmopara viticola*

Oïdium *Oidium tuckeri*

Pourriture grise *Botrytis cinerea*

Chancre bactérien *Agrobacterium vitis*

Eudémis de la vigne *Lobesia botrana*

Pyrale de la vigne *Theresimima ampelophaga*

Cochenille de la vigne *Pulvinaria vitis*

Acarien jaune de la vigne *Schizotetranychus viticola*

Chancre bactérien

Sur les plantes infectées sur les parties ligneuses, près de la surface du sol ou juste en dessous, on observe des renflements (tumeurs). Les plantes malades présentent une croissance ralentie, des feuilles chlorotiques et sont facilement détruites par l'hiver lors d'un hiver rigoureux.

Stratégie de lutte contre le ravageur :

En juillet, les vignes présentant des symptômes de la maladie doivent être marquées.

Cochenille de la vigne

L'éclosion des larves se poursuit pendant la première quinzaine de juillet. Elles causent des dégâts en suçant la sève des feuilles, des rameaux et des grappes. Elles muent une fois, se nourrissent pendant une certaine période, puis quittent les sites d'alimentation et se déplacent vers leurs lieux d'hivernage. Suite aux dégâts, les vignes s'affaiblissent.

Stratégie de lutte contre le ravageur :

La lutte chimique est menée contre les jeunes larves.

Produit phytosanitaire autorisé :

movento 100 sc - 0,075-0,095 % ;

