

Améliorer les conditions de développement des cultures agricoles

Автор(и): Растителна защита
Дата: 17.07.2017 Брой: 7/2017



Après la période de temps sec et chaud, un changement substantiel des conditions agrométéorologiques est attendu au cours de la prochaine période de sept jours. À la mi-juillet, des précipitations significatives, une baisse des températures et une amélioration des conditions pour le développement des cultures agricoles sont prévues. Il y aura une probabilité de grêle.

Après la période de temps sec et chaud, un changement substantiel des conditions agrométéorologiques est attendu au cours de la prochaine période de sept jours.

Les températures extrêmement élevées et la faible humidité atmosphérique du début de la deuxième décennie de juillet ont eu un effet défavorable sur une partie des cultures de printemps et ont provoqué la chute des fleurs et des fruits sur certaines cultures maraîchères (tomates, concombres, courgettes, haricots verts). Contrairement aux régions du nord et du centre, dans de nombreux endroits du sud de la Bulgarie, les précipitations de juillet n'ont eu aucune signification économique, ce qui a conduit à un approfondissement du déficit en humidité du sol. Dans certains endroits de la plaine de Thrace (les stations agrométéorologiques de Pazardzhik, Plovdiv, Sliven), il n'y a pas d'humidité dans la couche de sol de 50 cm, et dans la couche de 100 cm, les réserves en humidité du sol sont faibles – en dessous de 50–55% de la capacité au champ.

Au cours de la première moitié de la prochaine période de sept jours, des précipitations significatives, une baisse des températures et une amélioration des conditions pour le développement des cultures agricoles sont prévues.

D'ici la fin de la deuxième décennie, avec des températures proches de la normale et des réserves en humidité du sol améliorées, la floraison, la fécondation et le remplissage des graines du tournesol se poursuivront. Pour le maïs, selon sa précocité, différents stades seront observés – de l'épiaison pour les hybrides plus tardifs au début du stade de maturité laiteuse pour les hybrides précoces de maïs dans certains endroits des régions méridionales du pays. Pour le coton, le début du stade de floraison sera observé vers la fin de la période.

Au cours de la période, la probabilité de grêle et le risque d'égrenage sont à nouveau prévus. Des conditions plus favorables pour la conduite de la récolte du blé interviendront vers la fin de la deuxième décennie de juillet.

Actuellement, les rendements moyens obtenus pour le blé sont bons à très bons, dépassant dans de nombreux endroits du pays les 500 kg/da.