

Le scolyte de l'épicéa est une menace sérieuse pour les forêts de pins.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 17.07.2017 Брой: 7/2017



Un nombre croissant de forêts de pins en Bulgarie sont touchées par le bostryche des pousses de pin, qui provoque un dépérissement rapide et à grande échelle des peuplements de conifères. Des experts du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Forêts et de l'Agence exécutive des forêts ont discuté de mesures urgentes pour limiter les attaques de ce ravageur dangereux. L'une des principales raisons de l'apparition massive du bostryche des pousses de pin est le changement climatique, qui entraîne la sécheresse et rend les arbres facilement sensibles à divers agents pathogènes et ravageurs.

À la fin de la semaine dernière, une réunion s'est tenue à l'initiative du vice-ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Forêts, Atanas Dobrev, et de la direction de l'Agence exécutive des forêts. Les experts en

sciences forestières ont discuté en détail des dégâts causés par le bostryche des pousses de pin et des mesures urgentes à prendre immédiatement.

Les mesures comprennent l'accélération du processus d'attribution de la réalisation des coupes sanitaires et obligatoires, ainsi que l'implication de toutes les parties prenantes dans le processus de lutte contre le ravageur. Il est extrêmement important que tous les propriétaires forestiers, y compris privés, participent à la lutte contre ce ravageur forestier. À cette fin, des séminaires d'information seront organisés avec des représentants des autorités locales, qui aideront dans le processus d'identification et d'information des propriétaires forestiers privés concernant la limitation de l'invasion du bostryche des pousses de pin.

Le problème affecte principalement les forêts de conifères établies artificiellement et est causé principalement par leur boisement à des altitudes inférieures à leur aire de répartition naturelle. La science recommande uniquement la mise en œuvre de coupes sanitaires et obligatoires comme solution, ainsi que l'élimination du bois sec infecté et endommagé.

Les arbres endommagés et secs constituent également une menace potentielle d'incendie, en particulier pendant les mois d'été. L'abattage progressif des zones forestières touchées doit être effectué avec soin, sans changements drastiques de l'environnement et sans exposer de zones dénudées.

Pour maîtriser le problème, des efforts conjoints de toutes les parties prenantes sont nécessaires, ainsi que la compréhension du public.

Bostryche des pousses de pin (*Ips acuminatus* Gyll.)

Il est répandu dans toute l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord, ainsi que dans notre pays. Il attaque principalement le pin sylvestre – les parties supérieures de la cime, les branches plus épaisses et le tronc. Les galeries maternelles et larvaires interrompent les tissus conducteurs et l'arbre meurt en très peu de temps. Les aiguilles se fanent d'abord, puis prennent une couleur rouge caractéristique, c'est pourquoi les forêts touchées sont connues sous le nom de forêts rouges. Le bois endommagé est dévalué, les pertes sont énormes et les écosystèmes forestiers voient leurs fonctions altérées.

Dans des conditions favorables, le bostryche des pousses de pin produit deux générations par an : avril – mai et juillet – août. L'adulte hiverne et au printemps crée des trous de sortie ronds et attaque les arbres voisins. Les

larves se développent rapidement en 20 à 25 jours et en août, la deuxième génération attaque les arbres voisins.

Le changement climatique est le principal facteur derrière le développement d'une deuxième génération dans le nord de la Bulgarie.