

# Prévision agrométéorologique hebdomadaire pour la fin juillet et le début août

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 29.07.2017 Брой: 7/2017



*D'ici fin juillet et durant les premiers jours d'août, le développement des cultures agricoles se déroulera sous des températures proches des normes climatiques, et dans de nombreuses régions du pays – avec des réserves d'humidité du sol améliorées.*

Après les orages, la grêle et les pluies torrentielles (Roussé - 45 l/m<sup>2</sup>, Silistra - 43 l/m<sup>2</sup> et Choumen - 33 l/m<sup>2</sup>) qui sont tombés lors des derniers jours de la période écoulée, une stabilisation du temps et un changement des conditions agrométéorologiques sont attendus dans la période suivante. La grêle tombée en de nombreux endroits du nord de la Bulgarie (Vratsa, Polski Trambach, Trojan, Roussé, Tsarev Brod) n'a une fois de plus épargné les cultures agricoles. Des dégâts ont été causés à une partie des peuplements de blé non récoltés

(verse des cultures, égrenage des épis), ainsi qu'aux cultures de printemps, aux cultures maraîchères et aux arbres fruitiers.

Au début de la prochaine période, à la première occasion, il est préférable de traiter les cultures maraîchères, les arbres fruitiers et les vignes touchés par la grêle avec des fongicides à base de cuivre afin d'accélérer la cicatrisation des blessures et de réduire les infections secondaires par des agents pathogènes (pourriture grise sur les vignes, moniliose tardive sur les fruits des arbres fruitiers, mildiou de la pomme de terre et alternariose sur les tomates).

D'ici fin juillet et durant les premiers jours d'août, le développement des cultures agricoles se déroulera sous des températures proches des normes climatiques, et dans de nombreuses régions du pays – avec des réserves d'humidité du sol améliorées. Durant cette période, chez les hybrides de maïs précoces, on observera le stade de maturité laiteuse et une transition de la maturité laiteuse à la maturité pâteuse dans les peuplements à certains endroits de la plaine du Danube et dans les régions méridionales du pays. Chez le tournesol, le remplissage des graines aura lieu. Début août, une partie des peuplements du sud de la Bulgarie entrera dans le début du stade de maturation.

Durant cette période, la teneur en humidité accrue des couches supérieures du sol retardera par endroits l'achèvement de la récolte du blé.

*Source : INMHA-BAS*