

Agrometeorološka prognoza za ožujak 2019.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 18.03.2019 Брой: 3/2019



Početkom ožujka agrometeorološke će uvjete određivati vrijeme toplo za godišnje doba. Tijekom prve dekade, u većini ratarskih područja zemlje, prognozirane vrijednosti srednjih dnevnih temperatura premašivat će biološki minimum potreban za nastavak vegetacijskih procesa u ozimih žitarica i uljane repice.

Početkom druge dekade predviđa se pad temperatura, značajniji u sjevernoj Bugarskoj i na visokim poljima, što će ograničiti i odgoditi razvoj poljoprivrednih usjeva. Tijekom ove dekade, uvjeti za sporu vegetaciju u ozimim žitaricama stvorit će se uglavnom u krajnjem jugoistočnom i južnom dijelu zemlje.

Krajem druge i početkom treće dekade ožujka očekuje se poboljšanje temperaturnih uvjeta i aktivacija vegetacijskih procesa u jesenjim sjetvama i višegodišnjim nasadima. Do kraja ožujka, većina kasnorazvijenih

sastojina pšenice i ječma koje su prezimile u fazi 2–3 lista ući će u fazu busanja. U ozimih žitarica koje su obusale u jesen, primijetiti će se povećanje koeficijenta busanja. Krajem ožujka, uljana repica koja je prezimila u fazi rozete formirat će grane.

U ožujku će se u voćnim vrstama odvijati faze bubrenja i pucanja pupova.

Krajem mjeseca, kod ranocvatnih vrsta (badem, marelica, breskva) primijetiti će se faza cvjetnog pupa, a na pojedinim mjestima, uglavnom u južnim regijama, i početak cvatnje. Tijekom mjeseca, prognozirane minimalne temperature, do minus 8°C, predstavljat će rizik za najnaprednija stabla voćaka koja su ušla u faze formiranja pupova i cvatnje. Očekivane oborine u ožujku, oko normale, povećat će zalihe vlage u tlu u jednodmetarskom i dubljim slojevima tla. Krajem veljače, u većini ratarskih područja, zalihe vlage u tlu za ozime žitarice u jednodmetarskom sloju bile su iznad 90% poljskog vodnog kapaciteta (PVK). Iznimke su uočene na pojedinim mjestima u Dunavskoj ravnici (agrometeorološka postaja Novachene), u krajnje južnim (Haskovo) i istočnim regijama (D. Chiflik), gdje je razina zaliha vlage bila niža – 85–86% PVK. Tijekom mjeseca, povoljniji uvjeti za izvođenje predsetvene obrade površina namijenjenih sjetvi ranih i srednje ranih jarih usjeva, te za izvođenje tretmana zaštite bilja u voćnjacima, pojaviti će se početkom mjeseca, u drugoj polovici druge dekade i sredinom treće dekade. Sredinom ožujka počinje agrotehnički prozor (15.–20.03.) za sjetvu suncokreta u južnoj Bugarskoj, a sredinom treće dekade (25.03.–5.04.) – u Dunavskoj ravnici.

Izvor: NIMH