

Pogodni uvjeti za provođenje predsjetvenih obrada tla i sjetvu suncokreta bit će prisutni krajem ožujka.

Автор(и): Растителна заштита

Дата: 24.03.2019 Брой: 3/2019



Tijekom nadolazećeg razdoblja, agrometeorološki uvjeti bit će određeni temperaturama iznad klimatskih normi za treću dekadu ožujka.

Neuobičajeno za početak proljeća, razvoj ozimih usjeva u dijelu poljoprivrednih regija zemlje odvijat će se pod nezadovoljavajućim zalihama vlage u tlu u sloju od 50 cm – posljedica ispodprosječnih oborina na kraju zime, iznadprosječnih ožujskih temperatura i aktivne vegetacije usjeva koja je u tijeku. Krajem druge dekade ožujka, najniže zalihe vlage u sloju od 50 cm, mjerene u pšenici, zabilježene su na pojedinim mjestima u južnim i

jugoistočnim regijama zemlje, ispod 65% poljskog vodnog kapaciteta. Najbolje zalihe vlage, iznad 85–90% poljskog vodnog kapaciteta, zabilježene su za ozime usjeve u sjeverozapadnim dijelovima Dunavske ravnice.

Pred kraj razdoblja očekuje se pad temperatura i promjena agrometeoroloških uvjeta. Predviđene vrijednosti minimalnih temperatura, na pojedinim mjestima do minus 2°C, predstavljaju rizik za cvjetove i zretanje ploda koštičavog voća koje je uznapredovalo u razvoju, osobito ako se niske temperature zadrže dulje vrijeme.

Očekuju se daljnje oborine i poboljšat će se uvjeti za klijanje posijanih jarih usjeva.

U pšenici će se masovno opažati faza busanja, a na pojedinim mjestima u sjeveroistočnim regijama (Carev Brod, Donji Čiflik) – početak izdizanja stabiljke. U uljane repice bit će u tijeku formiranje grananja.

Tijekom većine dana u razdoblju, uvjeti će biti pogodni za obavljanje predviđene obrade tla i sjetvu suncokreta. Tijekom ovog razdoblja istječe optimalni rok za sjetvu suncokreta u južnoj Bugarskoj. Sredinom treće dekade ožujka počinje agrotehnički prozor za sjetvu suncokreta u Dunavskoj ravnici (25.03.–05.04.).

Izvor: NIMH