

Agrometeorološka prognoza za mjesec svibanj

Автор(и): Растителна защита
Дата: 10.05.2019 Брой: 5/2019



Početkom svibnja razvoj poljoprivrednih kultura odvijat će se uz temperature ispod normale i uz dobre rezerve vlage u tlu kao rezultat iznadprosječnih oborina u travnju. Oborine u travnju (Pleven - 116 l/m², Veliko Tarnovo - 63 l/m², Loveč - 125 l/m², Razgrad - 64 l/m², Dobrič - 60 l/m², Sofija - 78 l/m², Sandanski - 58 l/m², Pazardžik - 60 l/m², Plovdiv - 58 l/m², Haskovo - 89 l/m², Kardžali - 75 l/m², Elhovo - 79 l/m², Stara Zagora - 55 l/m², Karnobat - 52 l/m²), nakon rano proljetne suše, bile su odlučujuće za prevladavanje deficita vlage u tlu u jesenskim usjevima. Predviđene oborine tijekom prve dekade svibnja održavat će vrlo dobru razinu rezervi vlage u slojevima tla od 50 cm i 100 cm, iznad 85% poljskog vodnog kapaciteta (PVK). Ove oborine imat će povoljan učinak na ozime žitarice i uljanu repicu, koje su u reproduktivnoj fazi svog razvoja, s povećanim zahtjevima za vlagom u tlu. Tijekom tog razdoblja, u pšenici i ječmu u poljskim regijama zemlje, dogodit će se faza izdizanja

stabiljke, prijelaz iz izdizanja stabiljke u klasanje te faza klasanja. U uljane repice odvijat će se cvatnja, oplodnja i formiranje mahuna.

Krajem prve dekade predviđeni su prizemni mrazevi na višim poljima, što treba uzeti u obzir pri presađivanju rasada povrća i duhana. Značajno poboljšanje toplinskih uvjeta i ubrzanje vegetacijskih procesa u poljoprivrednim kulturama očekuje se tijekom prve polovice druge dekade.

Tijekom druge polovice svibnja agrometeorološki uvjeti ostat će nestabilni, s čestim oborinama. Razvoj poljoprivrednih kultura odvijat će se uz temperature oko i iznad klimatskih normi. Tijekom tog razdoblja, formiranje i nalijevanje zrna u ozimim žitaricama odvijat će se pod vrlo dobrim i optimalnim rezervama vlage u tlu. Krajem treće dekade, u pšenici i ječmu u južnim regijama i mjestimično u Podunavlju, uočat će se početak faze mliječne zrelosti. Tijekom mjeseca, u kukuruzu i suncokretu dogodit će se formiranje listova. Krajem svibnja, u suncokretu sijanom u agrotehničkom roku, uočat će se formiranje cvata. Česte oborine u svibnju stvorit će uvjete za povećanje infekcijske pozadine brojnih gljivičnih bolesti: u pšenici rđe (smeđa, žuta) i fuzarioza klasa; plamenjače u povrtnim kulturama i vinovoj lozi; rana smeđa trulež i rupičavost listova u koštičavom voću, parš u jabučastom voću, itd. Tijekom mjeseca, povoljniji uvjeti za provođenje tretmana zaštite bilja pojavit će se sredinom prve, u prvoj polovici druge te u trećoj dekadi.

U svibnju se predviđa povećana vjerojatnost tuče. U slučaju djelomične štete od tuče, preporučljivo je da se oštećeni usjevi prilikom prve mogućnosti tretiraju fungicidima koji sadrže bakar radi bržeg zacjeljivanja rana i smanjenja rizika od sekundarnih infekcija.

Izvor: DHMZ