

Bolesti i štetnici jagode i maline u svibnju

Автор(и): проф. д.с.н Иванка Лечева; проф. Мария Боровинова

Дата: 24.05.2019 Брой: 5/2019



Kod **maline** prskanja su usmjerena protiv didimele, antraknoze, sušenja baza izbojaka/leptosferioze/, sive plijesni, malinovog zlatka, malinove mušice, malinovog žiličara i malinovog cvjetonoše. Protiv bolesti koristi se jedan od sljedećih fungicida: Dithane M45 – 0,2%, Kocide 200 WG – 0,12%, Funguran OH 50 WP – 0,15% i Cuprozet Gold M – 0,15%. Za suzbijanje štetnika maline nema insekticida uvrštenog na popis odobrenih sredstava za zaštitu bilja. Prema Tsolovoj, 2002., insekticidi Bi-58 – 0,1%, Karate Zeon – 0,02%, Vaztak New – 0,015% i Decis 2,5 EC – 0,04% djelotvorni su protiv navedenih štetnika. Autorica preporučuje da se prva dva insekticida primijene pri prvom prskanju, a druga dva pri drugom prskanju. Po pojavi grinja, primjenjuje se NeemAzal TS u koncentraciji od 0,3–0,5%. Ovaj biopreparat također djeluje na lisne uši i cikade.

Plantaže jagode se u svibnju prskaju protiv sive plijesni, pepelnice, jagodinog rilaša i jagodinog stabljikovog rilaša. Protiv sive plijesni koristi se jedan od sljedećih fungicida: Switch 62,5 WG – 100 g/j, Signum WG – 75 g/j, Synpro SC – 150 ml/j, Captan – 150 g/j, Thiram 80 WG – 0,3%, Shavit F WDG – 0,2%, Prolectus 50 WG – 80–120 g/j. Za zaštitu jagode od pepelnice, prskanje se provodi jednim od odobrenih fungicida: Systhane 20 EW – 30 ml/j, Systhane Ecozon EW – 55–130 ml/j, Cidely Top DC – 10 ml/j, Ortiva Top SC – 100 ml/j, Shavit F 72 WDG – 0,2%, Thiovit Jet 80 WG – 500 g/j. Od navedenih fungicida, Cidely Top DC također je učinkovit protiv bijele pjegavosti lista.

Protiv rilaša koristi se Avant 150 EC – 25 ml/j ili Calypso 480 SC – 20 ml/j.