

Agrometeorološka prognoza za mjesec lipanj

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.06.2019 Брой: 6/2019



Većinu dana u lipnju agrometeorološke uvjete će odrediti nestabilno vrijeme s neravnomjerno raspoređenim oborinama, što će rezultirati i značajnim razlikama u razinama zaliha vlage u tlu. U zapadnoj Bugarskoj, gdje se očekuje da će lipanjske oborine, slično kao i u svibnju, doseći i premašiti mjesečne norme, prognoziraju se vrlo dobre zalihe vlage u tlu. Za jare usjeve, u sloju od 50 i 100 cm one će ostati iznad 80% poljskog vodnog kapaciteta (PVK). Niže razine zaliha vlage u tlu očekuju se u istočnim regijama, gdje se također prognozira manje oborina u lipnju.

Tijekom prvog i drugog desetljeća razvoj poljoprivrednih usjeva odvijat će se umjerenom brzinom, pod temperaturama bliskim klimatskim normama. Početkom lipnja, na višim poljima, odvijat će se punjenje zrna kod ozimih žitarica. Kod pšenice u nizinskim područjima opažat će se stadij mliječne zrelosti, dok kod ječma –

mliječna zrelost i prijelaz u voštanu zrelost. Kod pšenice, tijekom međufaznog razdoblja punjenje zrna – mliječna zrelost, ličinke štitastog smradca (*Eurygaster integriceps*) uzrokuju ozbiljnu štetu. Tijekom tog razdoblja, sastojine pšenice moraju se pregledati na prisutnost štetnika i, pri gustoćama koje premašuju prag ekonomske štete (2 ličinke/m²), insekticidni tretman je imperativ.

Krajem prvog i početkom drugog desetljeća, ječam će uglavnom biti u voštanoj zrelosti, a uljana repica u stadiju zrenja.

Tijekom trećeg desetljeća, razvoj poljoprivrednih usjeva odvijat će se ubrzanom brzinom, pod iznadprosječnim toplinskim uvjetima. U prvoj polovici ovog desetljeća, pšenica u nizinskim područjima će doseći voštanu i punu zrelost. Do kraja lipnja, dio jarih usjeva ući će u reproduktivne faze razvoja – kod suncokreta će započeti cvatnja, a kod ranih hibrida kukuruza – metličanje i cvatnja metlice.

Tijekom mjeseca, prognozirane maksimalne temperature, na pojedinim mjestima do 35°C, imat će negativan utjecaj na cvatnju i oplodnju povrtnih kultura. Meteorološki uvjeti u lipnju održavat će povišeni infektivni potencijal gljivičnih patogena: kasna smeđa trulež kod kasnijih sorti trešanja, čađavost i pepelnica kod voćaka, plamenjače u vinogradima i povrtnim kulturama. Kod vinove loze, međufazno razdoblje od cvatnje cvata do formiranja bobica veličine graška kritično je za infekciju plamenjačom. Tijekom prvog desetljeća lipnja prognozira se povećana vjerojatnost tuče, s opasnošću od peganja usjeva i dodatne štete na poljoprivrednim kulturama. Nakon tuče, pogođene voćne i povrtna kulture potrebno je prilikom prve mogućnosti tretirati fungicidima koji sadrže bakar.

Tijekom mjeseca, povoljniji uvjeti za provođenje vegetacijske obrade tla za jare usjeve nastupit će u trećem desetljeću.

Izvor: NIMH