

'Nestabilno vrijeme i iznad normalnih temperatura'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.06.2019 Брой: 6/2019



Većinu dana u sedmodnevnom razdoblju (21.–27.06.2019.) agrometeorološke uvjete će odrediti nestabilno vrijeme i iznadprosječne temperature. Na početku ljeta, predviđene iznimno visoke maksimalne temperature, na pojedinim mjestima do 37–38°C, otežat će vegetaciju jarih usjeva. Ove vrijednosti će negativno utjecati na formiranje reproduktivnih organa nekih povrtnih kultura (graška, rajčice, paprike, krastavaca, itd.), a pri niskoj vlažnosti zraka mogu uzrokovati opadanje cvjetova i plodova. Za sredinu razdoblja predviđa se pad temperatura i poboljšanje uvjeta za razvoj poljoprivrednih kultura.

Tijekom razdoblja, kod pšenice u nizinskim područjima, opažat će se masovna faza mekog zrna i puna zrelost, a na višim poljima – mliječna zrelost i prijelaz u meko zrno. Kod suncokreta će se odvijati formiranje cvata, a na

pojedinim mjestima u Podunavskoj nizini (agrometeorološke postaje Bázovec, Pavlikeni) u sjetvama će se također opažati početak cvatnje. Kod kukuruza će se odvijati formiranje listova. Pred kraj razdoblja, kod ranih hibrida, opažat će se početak metličanja. Do metličanja, sjetve kukuruza moraju se pregledati na prisutnost jednog od ekonomski najznačajnijih štetnika – kukuruznog plamenca (*Ostrinia nubilalis*). Kada gustoća štetnika prijede prag ekonomske štete (10 legala jaja na 100 biljaka), potreban je pravovremeni insekticidni tretman (protiv mladih ličinki prije nego što se ubušu u stabiljke).

Oborine tijekom razdoblja u mnogim dijelovima zemlje, s izuzetkom jugoistočnih regija i crnomorske obale, privremeno će ometati žetvu ječma i pšenice. Ponovno se predviđa povećana vjerojatnost tuče, s rizikom od polijeganja usjeva i osipanja zrna. Nakon tuče, preporuča se da se oštećene povrtne kulture i vinogradi prilikom prve mogućnosti tretiraju fungicidima koji sadrže bakar.

Izvor: DHMZ