

Povećana infektivna pozadina od gljivičnih patogenea u povrtnim i voćnim usjevima

Автор(и): Растителна защита
Дата: 18.07.2019 Брой: 7/2019



Tijekom sedmodnevnog razdoblja (19. – 25. srpnja) razvoj poljoprivrednih usjeva odvijaće se ubrzanim tempom, uz iznadprosječne temperature i, u dijelu južnih regija, uz dobre zalihe vlage u slojevima tla od 50 i 100 cm. Oborine tijekom drugog desetljeća srpnja na pojedinim mjestima u južnoj Bugarskoj premašile su 30-40 l/m² (Blagoevgrad - 41 l/m², Plovdiv - 34 l/m², Sliven - 56 l/m², Burgas - 40 l/m², Kardzhali - 41 l/m² i Chirpan - 33 l/m²). Ove su oborine imale povoljan učinak na jare usjeve, koji se nalaze u reproduktivnim fazama rasta s povećanom potrebom za vodom.

Tijekom tog razdoblja, suncokret će biti u fazi nalijevanja zrna. Kod kukuruza će se uočiti različite faze – od cvatnje i metličanja kod kasnih hibrida do faze mliječne zrelosti kod ranih hibrida kukuruza na poljskim

površinama u zemlji. U trećem desetljeću srpnja, poljski grah bit će u fazi zrenja, a pamuk će ući u početak cvatnje.

Tijekom nadolazećeg razdoblja, u većem dijelu zemlje, s izuzetkom nekih mjesta u istočnim regijama, predviđa se relativno suho vrijeme, što će pružiti prikladne uvjete za provođenje sezonskih agrotehničkih aktivnosti, od kojih je najvažnija završetak žetve pšenice. Trenutačno, prinosi pšenice postignuti na agrometeorološkim postajama NIMH-a kreću se između 420 kg/jutru na postajama Dolni Chiflik i Karnobat te 650 kg/jutru na postaji Glavinitsa.

Tijekom tog razdoblja, tretmane zaštite bilja treba provoditi tijekom hladnijih sati u danu uz upotrebu sredstava za zaštitu bilja s odgovarajućim prethodnim rokom (PHI) u skladu s razdobljem zrenja usjeva. Česte oborine tijekom prve polovice srpnja povećale su infektivnu pozadinu određenih gljivičnih patogena: peronosporne na povrtnim kulturama, kasne smeđe truleži na ranim sortima voća (breskve, nektarine, šljive i kruške). U trećem desetljeću srpnja, u voćnim kulturama, ne treba potcjenjivati suzbijanje druge generacije voćnih moljaca. U vinogradima, tretmani protiv pepelnice (oidij) mogu se kombinirati s onima protiv grinja i ličinki druge generacije europskog grozdovog moljca.

Izvor: NIMH