

Agrometeorološka prognoza za kolovoz

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.08.2019 Брой: 8/2019



Većinu dana u prvoj dekadi kolovoza agrometeorološke će uvjete određivati nestabilno vrijeme i temperature oko i nešto ispod normale za to razdoblje. Predviđeni meteorološki uvjeti na početku mjeseca povećat će razinu infekcija od određenih gljivičnih patogena: plamenjače na povrtnim kulturama iz kasne poljske proizvodnje, kasne smeđe truleži u voćnjacima i sive plijesni na ranim sortama grožđa u fazi zrenja.

Oborine krajem srpnja, koje su na pojedinim mjestima u sjeverozapadnim i središnjim regijama premašile 30-40 l/m² (N. Selo, Vidin, Vraca, Montana, Loveč, V. Tarnovo), i oborine koje se očekuju tijekom prve dekade kolovoza, imat će povoljan učinak na druge usjeve i na kasnije hibride kukuruza, u kojima će se odvijati formiranje i nalijevanje zrna. Tijekom dekade, srednje rani hibridi kukuruza bit će u fazi mliječne zrelosti, dok će

rani hibridi dostići fazu voštane i pune zrelosti (agrometeorološke postaje Bazovec, Kneža, Glavinica, Pazardžik, Plovdiv). Kod suncokreta, u Podunavlju i južnim regijama, nastupit će faza zrenja.

Krajem prve dekade predviđa se znatno povećanje temperatura i ubrzan napredak završnih faza razvoja kasnih poljskih usjeva. Tijekom druge i treće dekade, agrometeorološke će uvjete određivati relativno suho vrijeme i temperature oko i iznad klimatskih normi.

Tijekom druge polovice kolovoza, velik dio kasnih poljskih usjeva završit će svoj razvoj. Kod suncokreta opažat će se masovna tehnička zrelost, a kod soje – faza zrenja. Krajem mjeseca, kod srednje kasnih hibrida kukuruza prevladavat će voštana zrelost. Kod riže nastupit će faza mliječne zrelosti, a kod pamuka – otvaranje čaura.

Tijekom druge polovice mjeseca, deficit tlažne vlage u drugim usjevima produbit će se i zahtijevat će povećane norme navodnjavanja. Na mnogim mjestima u poljskim regijama, nedostatak vlage u gornjim slojevima tla otežat će kvalitetno izvođenje duboke orbe i predstjetvene obrade površina predviđenih za sjetvu ozimog uljane repice. Agrotehnički rokovi sjetve za uljanu repicu počinju u trećoj dekadi kolovoza.

U kolovozu, za kasne sorte voćaka, ne treba podcjenjivati štetnu aktivnost posljednje generacije voćnih moljaca. Relativno suho vrijeme tijekom većine dana u mjesecu bit će preduvjet za povećanje populacija grinja. U vinogradima je potrebno pratiti pojavu i gustoću ličinki treće generacije grozdova moljca. Zaštitno prskanje bilja treba provoditi tijekom hladnijih sati u danu proizvodima s odgovarajućim prethodnim rokom do žetve, u skladu s razdobljem zrenja usjeva.

Izvor: DHMZ