

Agrometeorološka prognoza za rujan

Автор(и): Растителна защита
Дата: 16.09.2019 *Брой:* 9/2019



Početak rujna agrometeorološke će uvjete određivati suho, toplo i na mnogim mjestima u nizinskim područjima vruće vrijeme, što će ubrzati tijek završnih faza razvoja kasnih ratarskih kultura. Tijekom prvog tjedna mjeseca srednje kasni hibridi kukuruza će dostići voštanu i punu zrelost, dok će kasni hibridi biti u fazi mliječne zrna i prijelaza u voštanu zrelost.

Većinu dana prvog desetljeća uvjeti će ostati pogodni za provođenje žetve suncokreta i za oslobađanje površina zasijanih ranijim hibridima kukuruza. Krajem desetljeća predviđa se pad temperatura i promjena agrometeoroloških uvjeta. Očekivane oborine, nakon pojačane suše krajem ljeta, poboljšat će stanje gornjih slojeva tla, što je preduvjet za kvalitetniju predsetvenu obradu i sjetvu ozimog uljane repice. Optimalni agrotehnički rokovi za sjetvu uljane repice su do kraja drugog desetljeća rujna.

Tijekom drugog i trećeg desetljeća agrometeorološke će uvjete određivati temperature bliske klimatskim normama. Do sredine rujna kasni hibridi kukuruza će završiti svoj razvoj; riža će biti u voštanoj i punoj zrelosti, a šećerna repa će dostići tehničku zrelost. U trećem desetljeću, ranije od uobičajenih rokova, kasne sorte vinskog grožđa će dostići tehnološku zrelost. Pamuk će biti u fazi zrenja.

Predviđene oborine tijekom druge polovice drugog i početka trećeg desetljeća bit će od velike važnosti za normalno nicanje uljane repice. U regijama gdje vlaga nije ograničavajući čimbenik, u usjevima posijanim unutar agrotehničkog roka, faza nicanja će se uočiti krajem rujna. U fazi nicanja ozbiljne štete na uljanoj repici uzrokuju repina buha (odrasli jedinci) i repina piljevina (lažne gusjenice), što zahtijeva praćenje tijekom ove faze kako bi se utvrdila pojava i gustoća populacije štetnika. Kada gustoća prijede prag ekonomske štete (PES za repinu buhu - 2 kukca po m²; PES za repinu piljevinu 2-3 lažne gusjenice po m²), tretman je obavezan.

U rujnu, za povrtne kulture iz kasne ratarske proizvodnje, ne treba podcjenjivati mjere zaštite bilja protiv gusjenica treće generacije pamučnog savijača, jer one uzrokuju štetu i pogoršavaju kvalitetu povrtnog uroda.

Tijekom trećeg desetljeća mjeseca, na višim poljima ne može se isključiti mogućnost stvaranja mraza, što treba uzeti u obzir prilikom berbe povrtnih kultura osjetljivih na mraz (rajčice, paprike).

Izvor: DHMZ