

# Рамуков савијач (*Helicoverpa armigera* L.)

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 17.09.2019 Број: 9/2019



Рамуков молјас (***Helicoverpa armigera* L.**) последњих је година све штетнији. Способан је нападати више од 120 врста култивираних и дивљих биљака. У поврћним културама узрокује црвицавоће плодова паприке, рајчице и патлиџана.

Штетни стadiј су личинке; оне глодају лишће, пупове и цвјетове, а у каснијем стadiју нападају зелене плодове, пробijају их и хране се њиховим садржајем. Мјере сузбијања против памуковог молјца ефикасне су када су усмјерене против младих личинка од другог до трећег ступња развоја. Како би се покрила генерација, потребно је провести два третмана у размаку од 8–10 дана, оvisно о метеоролошким условима и резидуалном ефекту инсектицида.

## Strategija suzbijanja štetnika

Redoviti terenski pregledi. Suzbijanje korovne vegetacije, gdje se odrasli hrane, polažu jajašca i mlade ličinke hrane prije nego što prijeđu na kultivirane biljke.

## Odobreni proizvodi za zaštitu bilja

Coragen 20 SC 14–20 ml/da; Avant 150 EC 25 ml/da; Altacor 35 WG 8–12 g/da; Ampligo 150 ZC 40 ml/da; Affirm 095 SG 150 g/da; Nurelle D / Sanba / Chlorsirin 550 EC 50 ml/da, itd.

U organskoj proizvodnji povrtnih kultura može se koristiti Rapax (*Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*, soj EG 2348) u dozi od 100–200 ml/da, registriran za rajčicu, papriku i patlidžan, te Cyneis 480 SC (Spinosad) 12.5–30 ml/da. Među mjerama za ograničavanje nadzemnih noćnih moljaca može se uključiti i parazitoid jajašaca *Trichogramma*; on se masovno uzgaja unaprijed u laboratorijskim uvjetima i pušta na ugrožena područja.