

Jesenske aktivnosti zaštite bilja u voćnjaku

Автор(и): д-р Елена Манчева, Виола АЕ – Сливен

Дата: 26.09.2019 Брой: 9/2019



U rujnu se nastavlja ljetno-jesenska suša. Izraženija je u istočnim regijama, gdje mjesečna količina oborina u prosjeku iznosi 25-30 l/m². U zapadnom dijelu zemlje ne prelazi 40-50 l/m².

U nekim godinama prosječna mjesečna količina oborina doseže između 5 i 10 l/m². Prosječna dnevna temperatura kreće se od 15 do 20 °C, a nakon 20. rujna smanjuje se za gotovo 2-3 °C. Najviša dnevna temperatura doseže 28-32 °C, a najniža prosječna temperatura je između 3 i 8 °C.

U ovim klimatskim uvjetima okolina je povoljna za pojavu i razmnožavanje višegeneracijskih kukaca i grinja. Razvijaju svoje posljednje generacije, a gustoća tih populacija uvelike će odrediti razinu štete u sljedećoj godini.

Tijekom mjeseca stvaraju se uvjeti za stvaranje obilne rose, što je uzrok infekcija s paršom na jabukama i kruškama, plamenjače na kasnim rajčicama i drugima.

Jabuke i kruške

Početkom mjeseca treba pratiti let jabukovača (kraj druge i djelomično treće generacije) i provesti tretmane gdje je potrebno.

Nakon temeljitog pregleda i otkrivanja kasnih infekcija parše, kao i za suzbijanje bolesti koje se razvijaju tijekom skladištenja plodova, provode se tretmani s Topsin M 70 WG - 0,1% ili Top plus 70 WP - 0,1%. Za dobro skladištenje jabuka i krušaka te za smanjenje truleži i propadanja tijekom skladištenja, preporučuje se i provedba jednog post-harvest tretmana s Topsin M 70 WG - 0,120%. Nakon prskanja, plodovi se ostave da se osuše, a zatim slažu u hladnjače ili duboke, prohladne podrumске просторе.

Vinogradi

Tijekom ovog razdoblja siva plijesan nanosi značajnu štetu vinovoj lozi od početka obojenja bobica pa sve do berbe. Stoga se u vlažnom i hladnom vremenu u rujnu provode tretmani s Topsin M 70 WG - 0,2%. U to vrijeme je u letu i odrasli kukac treće generacije grozdova moljca. Gusjenice oštećuju zrela ili već zrela grožđa. Za suzbijanje štetnika, u fungicidnu otopinu za prskanje dodaje se registrirani piretroid.

Jednogodišnje loze se prekrivaju zemljom 3-5 cm iznad mjesta cijepljenja. Ova se operacija provodi krajem rujna.

U skladu sa Zakonom o zaštiti bilja, poljoprivrednici su dužni koristiti samo sredstva za zaštitu bilja koja su odobrena za uporabu na određenoj kulturi i protiv određenog štetnika, te u odgovarajućoj dozi.

Sredstva za zaštitu bilja odobrena za stavljanje na tržište objavljuju se na web stranici Bugarske agencije za sigurnost hrane na elektroničkoj adresi: <http://www.babh.government.bg/> ili u "Popisu sredstava za zaštitu bilja odobrenih za stavljanje na tržište i uporabu" 2019.

Sredstva za zaštitu bilja treba kupovati samo od trgovačkih društava koja posjeduju odobrenje!

Pažnja! Prilikom rada sa sredstvima za zaštitu bilja moraju se poštivati svi zahtjevi za zaštitu na radu, zaštitu pčelinjih zajednica od trovanja i zaštitu okoliša od onečišćenja!