

Agrometeorološka prognoza za početak studenog

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.11.2019 Брой: 11/2019



Krajem proteklog razdoblja, u sjeveroistočnoj i sjeverozapadnoj Bugarskoj palo je između 10 i 20 l/m² oborina: u Novom Selu – 10 l/m², Vidin – 16 l/m², Ruse – 11 l/m², Razgrad – 10 l/m² i Silistra – 20 l/m², što je privremeno poboljšalo uvjete za početne faze razvoja ozimih žitarica. U ostalim regijama zemlje, oborine su bile beznačajne i tamo se razvoj poljoprivrednih kultura odvija s poteškoćama zbog deficita vlage u tlu.

Tijekom sljedećeg sedmodnevnog razdoblja, agrometeorološke će uvjete određivati toplo i pretežno suho vrijeme. Razvoj poljoprivrednih kultura, gdje vlaga tla nije ograničavajući čimbenik, odvijat će se uobičajenim tempom pri temperaturama oko i iznad klimatske norme. Za pšenicu, na agrometeorološkim postajama

Pavlikeni i Haskovo promatrat će se faza nicanja, na agrometeorološkim postajama Novachene i Silistra – početak formiranja listova, a na agrometeorološkim postajama Karnobat, Glavinitsa i Yambol – treći list.

Početak studenog, uvjeti će biti pogodni za obradu tla na poljima namijenjenim proljetnim usjevima, za sadnju mladih voćaka, te za prskanje voćaka s 5%-tnom otopinom uree nakon masovnog opadanja lišća. Tretmane treba provoditi pri mirnom vremenu pri brzinama vjetra do 2–3 m/s.

Izvor: NIMH