

Agrometeorološka prognoza za kraj godine

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.12.2019 Брой: 12/2019



Neuobičajeno toplo vrijeme u razdoblju tijekom druge dekade prosinca, s maksimalnim temperaturama iznad 16-17°C na mnogim mjestima u nizinskim područjima, dovelo je do ponovnog pokretanja vegetativnih procesa u ozimim žitaricama. Iznadprosječne prosinačke temperature imale su povoljan učinak na kasno posijane sjetve pšenice, te su neke od njih dosegle potrebnu sumu temperatura za ulazak u fazu trećeg lista. Na nekim lokacijama u sjeveroistočnoj Bugarskoj, gdje su zabilježene temperature od oko 19-20°C (Razgrad, Dobrič, Varna), također se povećao udio sjetvi pšenice u fazi busanja. Kao rezultat visokih temperatura u južnim regijama, kod nekih ranocvatućih grmova i drveća (dren, trešnja) potaknuto je neželjeno bubrenje pupova.

Početak treće dekade prosinca temperature su ponovno bile iznad normale, a prosječne dnevne vrijednosti u većini nizinskih područja bile su iznad biološkog minimuma potrebnog za pojavu odgođene vegetacije u ozimim

žitaricama.

Nakon neuobičajeno toplog vremena sredinom treće dekade prosinca, agrometeorološki će se uvjeti bitno promijeniti. Očekivano hlađenje krajem razdoblja dovest će do slabljenja i prestanka vegetativnih procesa u jesen posijanim usjevima te će spriječiti prerani, neželjeni razvoj u nekih višegodišnjih nasada, što bi rezultiralo smanjenjem njihove otpornosti na zimu.

U nizinskim područjima uvjeti će omogućiti obavljanje operacija obrade tla. Predviđene oborine tijekom treće dekade prosinca povećat će razinu zaliha vlage u tlu u sloju od 50 cm. Krajem jeseni, na nekim lokacijama u južnim regijama – agrometeorološke postaje Kyustendil, Chirpan i Sliven – zalihe vlage u tlu za pšenicu u sloju od 100 cm su nezadovoljavajuće, ispod 60% poljskog vodnog kapaciteta.

Izvor: NIMH