

Pozdravljamo siječanj s vrlo niskim minimalnim temperaturama

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.01.2020 Брой: 1/2020



Predviđene minimalne temperature tijekom mjeseca, do minus 15°C, u uvjetima bez snježnog pokrivača i uz dulje zadržavanje, bit će kritične za ozime žitarice koje nisu uspjele ući u fazu busanja tijekom svoje jesenske vegetacije. Ove vrijednosti također će biti kritične za nerazvijene sastojine ozime uljane repice koje, kao posljedica jesenske suše, nisu formirale rozetu (od 7–8 listova) – stadij u kojem biljke uspješno prezimljuju.

Visoke prosinačke temperature produžile su vegetaciju jesenje sjetve. Kao rezultat temperatura iznad normale, dio kasno nicanih ozimih žitarica u zapadnoj Bugarskoj, na agrometeorološkim postajama Kneja, Sofija, Kyustendil, formirao je 2–3 lista.

U siječnju će agrometeorološke uvjete određivati temperature oko i iznad klimatskih normi, što će održavati jesenju sjetvu i višegodišnje nasade u stanju mirovanja. Ozime žitarice ući će u najhladniji mjesec u godini u različitim fenološkim fazama – posljedica produžene jesenske suše i odgođene sjetve. Značajan dio sastojina prezimljavat će u fazi tri lista. U fazi busanja, odgovarajućoj fazi za prezimljavanje, nalazi se velik dio sastojina pšenice u istočnoj Bugarskoj, Silistra, Glavinitsa, Tsarev Brod, Dolni Chiflik, Yambol, Karnobat. Osnažene, u fazi nicanja i početnog formiranja listova, nalaze se neke od kasno sijanih ozimih žitarica (sijanih u studenom) na pojedinim mjestima u Podunavskoj nizini, na agrometeorološkim postajama Nikolaevo, Pavlikeni.

Predviđene minimalne temperature tijekom mjeseca, do minus 15°C, u uvjetima bez snježnog pokrivača i uz dulje zadržavanje, bit će kritične za ozime žitarice koje nisu uspjele ući u fazu busanja tijekom svoje jesenske vegetacije. Ove vrijednosti također će biti kritične za nerazvijene sastojine ozime uljane repice koje, kao posljedica jesenske suše, nisu formirale rozetu (od 7–8 listova) – stadij u kojem biljke uspješno prezimljuju.

Očekivane oborine u siječnju, oko i ispod normale, povećat će rezerve vlage u tlu u slojevima od 50 cm i 100 cm. Na početku zime, u većem dijelu zemlje, razina zaliha vlage u jednometarskom sloju tla neuobičajeno je niska za ovo godišnje doba. Na pojedinim mjestima u zapadnoj Bugarskoj, na agrometeorološkim postajama Kneja, Kyustendil, te u nekim istočnim regijama, na agrometeorološkim postajama Razgrad, Sliven, ona je ispod 65% poljskog vodnog kapaciteta (PVK).

U siječnju će se povoljniji uvjeti za provođenje zimskog rezidbe u vinogradima i voćnjacima pojaviti tijekom druge polovice mjeseca.

Izvor: NIMH