

# Dinamično vrijeme s čestim oborinama u ožujku

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 02.03.2020 Брой: 3/2020



Iznadprosječne sezonske temperature tijekom druge polovice veljače nastavile su vegetaciju velikog dijela prezimljenih poljoprivrednih kultura.

Tijekom prvog desetljeća ožujka, agrometeorološke će uvjete ponovno određivati iznadprosječne temperature. Predviđeno toplo vrijeme na početku mjeseca, s maksimalnim temperaturama do 18-19°C, aktivirat će vegetativne procese u jesen zasađenim usjevima i voćkama u nizinskim predjelima zemlje. Očekivane oborine tijekom desetljeća poboljšat će zalihe vlage u tlu u pedeset centimetara dubokom sloju tla i uvjete za razvoj ozimih žitarica i ozime uljane repice. Tijekom tog razdoblja, značajan dio sastojina pšenice, koje su prezimile u fazi trećeg lista, ući će u fazu busanja. Kod uljane repice prevladavat će faza rozete.

Tijekom drugog desetljeća, predviđene temperature, oko i nešto ispod klimatskih normi, ograničit će razvoj poljoprivrednih kultura. Na pojedinim mjestima u sjevernoj Bugarskoj i u zapadnim regijama, gdje oborine u obliku snijega nisu isključene, opazit će se slabljenje i kratkotrajni prestanak vegetacije u jesen zasađenim usjevima. U preostalim regijama zemlje, vrijednosti srednjih dnevnih temperatura bit će bliske biološkom minimumu potrebnom za razvoj ozimih žitarica i ozime uljane repice.

Tijekom trećeg desetljeća ožujka, očekuje se poboljšanje toplinskih uvjeta i aktivacija vegetativnih procesa u jesen zasađenim usjevima. Krajem mjeseca, u pšenici će prevladavati faza busanja. Kod ozimih žitarica sijanih u optimalnom agrotehničkom razdoblju, opazit će se povećanje koeficijenta busanja.

U ožujku će se u voćnim vrstama odvijati sljedeće fenološke faze: bubrenje i pucanje pupova, a krajem trećeg desetljeća, kod koštičavog voća (badem, marelica, breskva) u nizinskim predjelima, opazit će se formiranje cvjetnih pupova i cvatnja. Predviđene minimalne temperature tijekom mjeseca, do minus 8°C, predstavljat će rizik za voćne vrste koje su naprednije u svom razvoju i ušle su u faze formiranja cvjetnih pupova i cvatnje.

Oborine u veljači, nakon duge zimske suše, pridonijele su prevladavanju deficita vlage u ozimim žitaricama u gornjim slojevima tla. Očekivane oborine u ožujku, oko i iznad norme, povećat će zalihe vlage u tlu u jednometarskom sloju tla.

Većinu dana u ožujku, predviđeno dinamično vrijeme, s čestim oborinama, otežat će provedbu nekih sezonskih agrotehničkih aktivnosti. Povoljniji uvjeti za provođenje zaštitnih tretmana voćnjaka prije cvatnje, te za predsjetvenu obradu površina namijenjenih ranim i srednje ranim proljetnim usjevima, pojavit će se početkom mjeseca i većinom dana trećeg desetljeća. Sredinom ožujka počinje agrotehnički prozor (15.-20.03.) za sjetvu suncokreta u južnoj Bugarskoj, a sredinom trećeg desetljeća (25.03.–5.04.) – u Podunavlju.

*Izvor: NIMH*