

Teške mjere zaštite bilja sredinom ožujka

Автор(и): Растителна защита
Дата: 19.03.2020 Брой: 3/2020



Početkom ožujka, u zapadnoj i središnjoj Bugarskoj palo je 20 – 40 l/m² oborina, što je dovelo do povećanja zaliha vlage u tlu u sloju od 50 cm i 100 cm u poljoprivrednim usjevima.

Sredinom ožujka, agrometeorološke će uvjete određivati prosječne dnevne temperature oko i iznad biološkog minimuma za prezimljavajuće poljoprivredne kulture. Njihovi vegetacijski procesi odvijat će se uobičajenom brzinom. Predviđene oborine tijekom prve polovice razdoblja, opet značajnije po količini u jugozapadnoj i središnjoj Bugarskoj, pogodovat će povećanju zaliha vlage u jednometarskom sloju tla.

Tijekom razdoblja, pšenica će biti u fazi masovnog klasanja i uočiti će se povećanje koeficijenta klasanja. U uljane repice dogodit će se grananje. U voćnih vrsta dogodit će se bubrenje i pucanje pupova, a u nekih

koštičavih vrsta (breskva, marelice) u središnjoj i istočnoj Bugarskoj, pojavit će se i faza cvatnje. Tijekom razdoblja, u južnoj Bugarskoj počinje agrotehnički rok sjetve suncokreta.

Predviđene oborine na mnogim mjestima u poljskim područjima otežat će izvođenje kvalitetne obrade tla i provedbu mjera zaštite bilja.

Izvor: DHMZ