

Značajan porast temperatura početkom travnja

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.04.2020 Брой: 4/2020



Nakon neobičnih zimskih vremenskih događaja krajem ožujka i početkom travnja, koji su prouzročili dodatnu štetu na voćnim kulturama uznapredovalim u svom razvoju, tijekom sljedećeg sedmodnevnog razdoblja agrometeorološki uvjeti će doživjeti značajnu promjenu.

Za prve dane razdoblja predviđa se porast temperatura. U poljskim područjima njihove prosječne dnevne vrijednosti će doseći i premašiti biološki minimum potreban za vegetaciju ozimih žitarica i uljane repice.

Pred kraj razdoblja predviđa se normalizacija temperaturnih uvjeta i aktivacija vegetativnih procesa u jesenjim sjetvama i posijanim proljetnim usjevima. Krajem prve desetke travnja, u pšenici i ječmu će se uočiti sljedeće faze: busanje, prijelaz u fazu izdizanja stabiljke i faza izdizanja stabiljke, uglavnom u sjetvama u dijelovima

Dunavske nizine i u istočnim regijama zemlje (agrometeorološke postaje: Novachene, Silistra, Tsarev Brod, Razgrad, D. Chiflik, Karnobat). U ozimoj uljanoj repici uočit će se početak faze formiranja pupova.

Do kraja prve desetke travnja, na mnogim mjestima u poljskim regijama, visok sadržaj vlage u gornjim slojevima tla, kao rezultat obilnih oborina početkom proljeća, otežavat će izvođenje predsjetvene obrade tla i sjetvu srednje ranih proljetnih usjeva. Iz tog razloga očekuju se kašnjenja u sjetvi suncokreta. Agrotehnički rok za sjetvu suncokreta u Dunavskoj nizini je do sredine prve desetke travnja, a do kraja desetke – u sjeveroistočnoj Bugarskoj, u obalnim područjima i na visokim poljima jugozapadne Bugarske.

Povoljni uvjeti za provođenje zaštitnih tretmana prskanjem u voćnim kulturama koje nisu pogođene proljetnim mrazovima nastupit će tijekom druge polovice razdoblja.

Izvor NIMH