

Dlakavi cvrčak – *Epicometis hirta*

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.04.2020 Брой: 4/2020



Opis štetnika

Dlakavi skakavac je široko rasprostranjen štetnik voćnih kultura u Bugarskoj. Potpuno uništava napadnute cvjetove glodanjem svih cvjetnih organa (latice, prašnici, tučak). Osim toga, gloda neraspuće cvjetne pupoljke, mlade izbojke i mlade listove. Među voćnim kulturama najjače napada i oštećuje dunju, krušku, jabuku, a rjeđe šljivu, višnju, breskvu i jagodu. Osim njih, napada i bobičasto voće, vinovu lozu, kupusnjače, žitarice, mahunarke, neke biljke iz porodica Chenopodiaceae i Apiaceae, itd.

Šteta:

Štetnik razvija jednu generaciju godišnje i prezimjava kao odrasli kukac u tlu. Kukci postaju aktivni rano u proljeće i uzrokuju štetu tijekom cvatnje, napadajući sve cvjetajuće voćne vrste. Aktivni su po sunčanom vremenu, dok se po hladnom i hladnom vremenu skrivaju ispod grudvi zemlje ili ostaju nepomični na biljkama.

U suhim i toplim proljećima, šteta koju uzrokuje kukac je značajna. Odrasli se hrane cvjetovima, glodajući tučke, prašnike i latice.

Cvjetovi požute i izgledaju kao da su oštećeni mrazom. Kukac također gloda udubljenja u mladim plodovima, posebno kod trešnje, koji se deformiraju.

Suzbijanje:

Dlakavi skakavac se pojavljuje tijekom razdoblja cvatnje voćnih kultura, a uporaba sredstava za zaštitu bilja je vrlo ograničena.

Na malim površinama primjenjuje se ručno sakupljanje u jutarnjim satima i uništavanje kukaca, nakon protresanja grana ili cijelih stabala.

Mjere suzbijanja provode se pri ekonomskom pragu štete od 3–5 jedinki/100 rozeta, ili 5% oštećenih cvatova. Kemijsko suzbijanje dlakavog skakavca je teško, prvo zato što se provodi tijekom cvatnje i većina sredstava za zaštitu bilja su štetna za pčele, a drugo zato što pokrov tijela kukca pruža vrlo dobru zaštitu od pesticida.

Registrirani insekticidi za suzbijanje: Vaztak Nov 100 EC – 10 ml/da (u uljanoj repici).