

Kuna može prouzročiti ozbiljnu štetu na plodovima trešnje.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.05.2020 Брой: 5/2020



Zlatna zlatarica – *Cetonia aurata* L. rasprostranjena je na cijelom području. Oštećuje voćke, s prednošću trešnju i krušku. Također se nalazi na vinovoj lozi, ruži i šipak-šipku. Dodatno je utvrđeno da uzrokuje štetu na kukuruzu i kupusu. Najčešće se javlja na cvjetovima šipak-šipka i ruže. Također se hrani cvjetnim dijelovima kamilice, korijandra i stolisnika.

Posljednjih godina zlatna zlatarica primijećena je u nekim nasadima trešanja i okućnicama u regiji Kyustendil. Gustoća njezine populacije veća je u zakorovljenim područjima i u zaraslim grmovima šipak-šipka i nasadima trešanja. Na pojedinačnim stablima zabilježeno je do 80 – 100 kukaca.

Odrasli kukac je relativno velika zlatarica. Duljina tijela je do 2 cm. Prsni štiti i pokrilca su intenzivno zelene boje sa zlatnim metalnim sjajem. Trbušna strana je bakreno-crvene boje. Na pokrilcima se nalaze bijele poprečne pruge.

Zlatna zlatarica ima jednu generaciju godišnje. Kukci prezimljuju u tlu. U proljeće se pojavljuju tijekom cvatnje voćaka. Kukci su aktivni i lete oko podneva, kada je najtoplije. Glodaju prašnike i tučak cvjetova te oštećuju lišće i plodove.

Na zaraženim plodovima trešanje glodaju duboke rane i u većini slučajeva ih potpuno uništavaju. Zabilježili smo 80% oštećenih plodova na jednom stablu.

Šteta

Oplođene ženke polažu jajašca u trulo drvo i u tlo bogato trulim drvetom. Ličinke se razvijaju u tom trulom okruženju i u istoj godini se učahure.

Kemijsko suzbijanje zlatne zlatarice treba usmjeriti na odrasli stadij, koji uzrokuje glavnu štetu. Insekticidi do sada nisu testirani protiv ovog štetnika jer se nije često pojavljivao. Suzbijanje je također otežano činjenicom da se prskanje mora provesti u vrijeme zrenja plodova i moraju se poštivati karantenski rokovi.

Suzbijanje

Zlatna zlatarica pripada obitelji skarabeja, koja također uključuje i dlakavog skarabeja. Preporuča se korištenje insekticida s kratkim rokom čekanja do berbe, koji su odobreni protiv dlakavog skarabeja: Vaztak Nov 100 EC – 10 ml/da. Također se mogu koristiti svijetloplave ili bijele klopke s atraktantom. Kako bi se smanjila šteta koju uzrokuje zlatna zlatarica, potrebna je i dobra agronomska praksa – redovita obrada tla, gnojidba, prikupljanje, uklanjanje i uništavanje korovne vegetacije, grmova šipak-šipka i trulih biljnih ostataka, gdje se razvijaju ličinke štetnika.