

'Padaline i povećani rizik od tuče početkom svibnja'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.05.2020 Брой: 5/2020



Tijekom sljedećeg sedmodnevnog razdoblja, agrometeorološki uvjeti bit će određeni nestabilnim vremenom i prosječnim dnevnim temperaturama bliskim klimatskim normama za prvu dekadu svibnja. Tijekom razdoblja predviđaju se oborine na širokom području, uz poboljšanje uvjeta za vegetaciju jesenski posijanih usjeva i posijanih proljetnih usjeva. Nakon pojačane proljetne suše u sjeveroistočnim regijama, očekivane oborine pružit će priliku za oporavak dijela ozimih žitarica koje su u kritičnom stanju. Nedostatak vlage u tlu na mnogim mjestima u sjeveroistočnoj Bugarskoj bio je ograničavajući čimbenik za razvoj pšenice i uzrok žućenja dijela sastojina.

U jugozapadnim regijama i u većem dijelu Tračke nizine, gdje su u travnju pale oborine od gospodarskog značaja – na nekim mjestima preko 50-60 l/m² (Kyustendil-67 l/m², Blagoevgrad-52 l/m², Sandanski-73 l/m², Pazardzhik-83 l/m², Plovdiv-87 l/m², Haskovo-93 l/m², Stara Zagora-50 l/m², Chirpan-67 l/m²), stanje ozimih žitarica je dobro.

Tijekom sljedećeg razdoblja, na poljskim površinama pšenica i ječam će proći prijelaz iz faze izdizanja stabiljike u fazu klasanja i metlicanja. Za kukuruz i suncokret, ovisno o datumima sjetve, promatrat će se faze nicanja i formiranja listova.

Tijekom prvog tjedna svibnja, ne predviđaju se kritične minimalne temperature za poljoprivredne kulture, ali vjerojatnost tuče ostaje povećana. U slučaju oštećenja od tuče, preporuča se da se zahvaćeni usjevi prilikom prve mogućnosti tretiraju fungicidima koji sadrže bakar kako bi se smanjio rizik od sekundarnih infekcija.

Izvor: NIMH