

Agrometeorološka prognoza za mjesec svibnja

Автор(и): Растителна защита
Дата: 17.05.2020 Брой: 5/2020



Tijekom prvog desetljeća svibnja razvoj poljoprivrednih usjeva odvijat će se umjerenim tempom, s prosječnim dnevnim temperaturama blizu klimatskih normi. Početkom svibnja očekivane oborine bit će odlučujuće za preživljavanje dijela usjeva ozimih žitarica u sjeveroistočnoj Bugarskoj. Krajem travnja, na mnogim mjestima u sjeveroistočnim regijama, razina zaliha vlage u tlu za pšenicu u slojevima tla od 50 cm i 100 cm bila je neuobičajeno niska za ovo godišnje doba, ispod 55-60% poljskog vodnog kapaciteta, kao posljedica ispodprosječnih oborina tijekom prve polovice proljeća. Iz tog razloga, dio nasada pšenice je u kritičnom stanju. Oštećenja i žutilo lisne mase (do 50-60%), kao posljedica deficita vlage u tlu, zabilježeni su na pšenici na agrometeorološkim postajama Silistra i Tsarev Brod.

Tijekom prvog desetljeća svibnja, u poljskim regijama uočiti će se faza klasanja kod pšenice i ječma.

Krajem prvog i tijekom drugog desetljeća, predviđa se porast temperatura i ubrzanje vegetacije kod ozimih žitarica i posijanih jarih usjeva. Tijekom tog razdoblja kod pšenice će se odvijati cvatnja, oplodnja i formiranje zrna.

Tijekom trećeg desetljeća, agrometeorološki uvjeti bit će određeni nestabilnim i hladnim vremenom za to razdoblje. Očekivane značajne oborine bit će od iznimno velike važnosti za ozime žitarice, u kojima će biti u tijeku nalijevanje zrna. Krajem svibnja, dio nasada ječma i pšenice na pojedinim mjestima u južnim regijama ući će u fazu mliječne zrelosti.

Tijekom mjeseca, kod kukuruza i suncokreta odvijat će se formiranje listova. Krajem trećeg desetljeća, kod suncokreta posijanog u agrotehničkom roku, uočit će se formiranje cvata.

Kod voćaka dogodit će se formiranje i povećanje plodova. Kod vinove loze uočit će se izdvajanje cvata i, krajem mjeseca, također faza cvatnje.

Česte oborine u svibnju stvorit će povoljne uvjete za razvoj brojnih gljivičnih bolesti: plamenjače na vinovoj lozi i povrtnim kulturama; čađavost na jabučastom voću, rana smeđa trulež i rupičavost lišća na koštičavom voću; rđe (žuta, smeđa) i fuzarioza klasa kod ozimih žitarica.

Pogodniji uvjeti za provođenje tretmana zaštite bilja pojavit će se u drugoj polovici prvog i većinom dana drugog desetljeća.

U svibnju se ne predviđaju kritične minimalne temperature za poljoprivredne kulture, ali vjerojatnost tuče ostaje povećana. U slučaju oštećenja od tuče, preporučljivo je da se zahvaćeni usjevi prilikom prve mogućnosti tretiraju fungicidima koji sadrže bakar radi bržeg zacjeljivanja rana i smanjenja rizika od sekundarnih infekcija.

Izvor: NIMH