

Agrometeorološka prognoza za mjesec lipanj

Автор(и): Растителна защита
Дата: 10.06.2020 Брой: 6/2020



Tijekom većine dana prve i druge desetodnevnice lipnja, agrometeorološki uvjeti bit će određeni nestabilnim vremenom. Na početku mjeseca, razvoj poljoprivrednih usjeva odvijat će se sporijim tempom, uz temperature ispod normale. Do sredine prve desetodnevnice, predviđaju se oborine u mnogim dijelovima zemlje, što će poboljšati zalihe vlage u tlu u sloju od 50 cm i uvjete za vegetaciju jarih usjeva. Oborine krajem svibnja i očekivane oborine početkom lipnja pokazale su se prekasnim za ozime usjeve na mnogim mjestima u istočnoj Bugarskoj, gdje su se reproduktivne faze njihova razvoja odvijale pod sve većim deficitom vlage u tlu. U velikom dijelu istočnih regija predviđaju se znatno smanjeni prinosi, a na nekim mjestima prerano požutjeli usjevi, slabo napunjenih klasova, neće se ni žeti.

Nakon hladnijeg vremena od uobičajenog za ovo godišnje doba tijekom druge polovice prve desetodnevnice, predviđa se poboljšanje toplinskih uvjeta. Tijekom desetodnevnice, kod ozimih

žitarica na visokim poljima, odvijat će se punjenje zrna. U nizinskim područjima, pšenica će biti u fazi mliječne zrelosti, a do kraja desetodnevnice, na nekim mjestima, uočiti će se i početak faze voskaste zrelosti. *Tijekom interfaznog razdoblja od punjenja zrna do mliječne zrelosti, ozbiljne štete na pšenici uzrokuju ličinke štitastog smradavca. Tijekom tog razdoblja potrebno je nadzirati usjeve pšenice na prisutnost ovog štetnika, a ako njegova gustoća prijede ekonomski prag štetnosti, potreban je pravovremeni tretman.*

Početak druge desetodnevnice, u nizinskim područjima ječam će uglavnom biti u fazi voskaste zrelosti, a uljana repica u fazi zrenja.

Tijekom druge polovice lipnja, razvoj poljoprivrednih usjeva odvijat će se bržim tempom. Krajem druge i početkom treće desetodnevnice, pšenica će uglavnom biti u fazi zrenja.

Do kraja lipnja, dio jarih usjeva ući će u reproduktivne faze svog razvoja: kod suncokreta uočiti će se početak cvatnje, a kod ranijih hibrida kukuruza – metličanje i cvatnje metlice.

Predviđeno nestabilno vrijeme u lipnju, s čestim oborinama, stvorit će uvjete za razvoj niza gljivičnih bolesti: plamenjače u vinogradima i povrtnim usjevima, pepelnice u voćnim stablima, itd. Tijekom mjeseca, vjerojatnost tuča ostat će povećana. Nakon tuče, pogođene voćne i povrtne kulture potrebno je prilikom prve mogućnosti tretirati fungicidima na bazi bakra.

Izvor: NIMH