

Agrometeorološka prognoza za srpanj

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.07.2020 Брой: 7/2020



Tijekom prve polovice prve desetodnevnicе srpnja, razvoj poljoprivrednih usjeva odvijat će se u uvjetima iznadprosječnih temperatura. Početkom mjeseca, u većem dijelu zemlje, s izuzetkom krajnjih sjeverozapadnih (agrometeorološka postaja Buzovets) i jugozapadnih regija (agrometeorološka postaja Sandanski), vegetacija jarih usjeva odvijat će se u uvjetima dobrih rezervi vlage u tlu u slojevima od 50 cm i 100 cm (preko 75-80% poljskog vodnog kapaciteta) – kao rezultat značajnih, iznadprosječnih lipanjskih oborina, koje su na pojedinim mjestima premašile 90-100 l/m² (Montana – 96 l/m², Veliko Tarnovo – 133 l/m², Ruse – 90 l/m², Silistra – 136 l/m², Dobrich – 105 l/m², Varna – 103 l/m², Kazanlak – 104 l/m², Haskovo – 92 l/m², Kardzhali – 173 l/m², Stara Zagora – 115 l/m²).

Tijekom prve desetodnevnice, ovisno o ranosti hibrida kukuruza, pojavit će se različite faze: formiranje listova, metličanje, cvatnja metlice i svilanje. Kod suncokreta, na poljskim površinama prevladavat će faza cvatnje, dok će u sastojinama na višim poljima biti formiranje cvata. Kod zrnatih mahunarki (grah, soja), opazit će se formiranje mahuna.

Tijekom druge i početkom treće desetodnevnice, razvoj poljoprivrednih usjeva odvijat će se umjerenim tempom, pri temperaturama oko i nešto ispod normale za to razdoblje. Predviđene česte oborine tijekom ovog razdoblja imat će povoljan učinak na jare usjeve koji su u reproduktivnoj fazi svog razvoja, kada potreba za vodom naglo raste (kod kukuruza, u razdoblju od metličanja do mliječne zrelosti, dnevna potrošnja vode doseže 6-7 m³/dulum). Početkom treće desetodnevnice srpnja, dio ranih hibrida kukuruza na poljskim površinama ući će u fazu mliječne zrelosti. Kod suncokreta, odvijat će se formiranje i nalijevanje sjemena. Krajem mjeseca, u sastojinama sijanih u agrotehničkom roku, na pojedinim mjestima u Podunavlju i u južnim regijama, opazit će se početak faze zrenja.

Tijekom posljednjeg tjedna srpnja, agrometeorološki uvjeti bit će određeni relativno suhim, toplim i vrućim vremenom, što će zahtijevati primjenu odgovarajućeg režima navodnjavanja za kasne hibride kukuruza i povrtarske kulture iz kasne poljske proizvodnje. Meteorološki uvjeti tijekom ovog razdoblja ograničit će razvoj brojnih gljivičnih bolesti, s izuzetkom pepelnice na povrtarskim kulturama i voćnim drvećem, te pepelnice (oidija) na vinovoj lozi.

U srpnju ne treba podcjenjivati tretmane zaštite bilja u voćnim kulturama protiv druge generacije voćnih savijača, lisnih uši i grinja. Prikladniji uvjeti za provođenje tretmana zaštite bilja javit će se većinom dana prve i treće desetodnevnice, tijekom hladnijih sati dana.

Tijekom najtoplijih razdoblja srpnja, s maksimalnim temperaturama do 38-39°C, povećat će se opasnost od požara tijekom žetve žitarica.

Izvor: NIMH