

Agrometeorološka prognoza za kraj srpnja

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.07.2020 Брой: 7/2020



Krajem srpnja, agrometeorološke će uvjete određivati vruće vrijeme s temperaturama oko i iznad norme. Tijekom prve polovice razdoblja, ponovno se predviđaju oborine u zapadnoj i u nekim dijelovima središnje Bugarske, što će poboljšati vlažnost gornjih slojeva tla. Tijekom proteklog razdoblja u tim regijama zabilježene su poljoprivredno značajne oborine između 20 – 40 l/m², ali lokalnog karaktera. U ostatku zemlje, izostanak oborina doveo je do sve većeg deficita vode u tlu.

Tijekom razdoblja, u suncokretu će se odvijati fenofaze cvatnje i punjenja sjemena. Kod nekih ranijih hibrida, posijanih u agrotehničkom roku, javit će se faza zrenja (agrometeorološke postaje Sliven, Lyubimets). U kukuruзу će se opažati različite faze – kod kasnih hibrida bit će u tijeku metličanje i cvatnja, kod srednje ranih hibrida opazit će se svlanje i smeđenje svile, a kod najranijih hibrida kukuruza u dijelovima Dunavske nizine

(agrometeorološka postaja Pavlikeni) opaziti će se mliječna zrelost. U vinovoj lozi opaziti će se faza obojenja i omekšavanja bobica.

Tijekom razdoblja, uvjeti će biti pogodni za provođenje sezonskih agrotehničkih aktivnosti povezanih s obradom tla na površinama oslobođenim od ozimih žitarica – krtičarenje, s ciljem prekida kapilara tla i očuvanja postojeće vlage u tlu, predstjetvena orba i priprema tla, te tretmani totalnim herbicidima u slučaju jakog zakorovljavanja površina nakon žetve. U nasadima jabuka i vinogradima nastavlja se prskanje fungicidima za sprječavanje infekcije i razvoja pepelnice. Zaštitne mjere na biljkama treba provoditi pri temperaturi zraka ne višoj od 25°C.

Izvor NIMH