

Agrometeorološka prognoza za kolovoz

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 09.08.2020 Број: 8/2020



Agrotehnički rok sjetve uljane repice počinje u trećoj dekadi kolovoza. U kolovozu se kod kasnih sorti voćaka ne smije podcjenjivati štetna aktivnost posljednje generacije voćnih crva. Relativno suho vrijeme tijekom većeg dijela mjeseca bit će preduvjet za povećanje populacija grinja. U vinogradima je potrebno pratiti pojavu i gustoću gusjenica treće generacije europskog grozdovog moljca.

U kolovozu će agrometeorološke uvjete određivati temperature i oborine bliske klimatskim normama za taj mjesec.

Početak kolovoza razvoj kasnih jarih usjeva u većem dijelu zemlje odvijat će se uz produbljivanje deficita vlage u tlu. Iznimke će se uočiti na pojedinim mjestima u sjeverozapadnoj Bugarskoj i na Sofijskom polju, gdje su oborine u srpnju premašile mjesečne norme (Novo Selo - 84 l/m², Vraca - 128 l/m², Montana - 88 l/m², Sofija - 111 l/m², Kjustendil - 72 l/m², Dragoman - 56 l/m²) i povećale razinu zaliha vlage u sloju tla od 50 i 100 cm. U zapadnim regijama zemlje, predviđene oborine tijekom druge polovice prve dekade kolovoza osigurati će vlagu za vegetaciju kasnijih hibrida kukuruza i drugih usjeva.

U istočnoj Bugarskoj i južnim regijama ne očekuju se oborine tijekom prve dekade kolovoza, a na pojedinim mjestima će produbljivanje suše dovesti u pitanje uroda jarih usjeva uzgojenih u ne-navodnjavanim uvjetima. U nekim od tih regija, kao rezultat oskudnih srpanjskih oborina - na mjestima ispod 2-3 l/m² (Ruse, Šabla, Stara Zagora, Sliven, Karnobat, Burgas, Haskovo, Kardžali), zalihe vlage u tlu u sloju od 50 i 100 cm potpuno su iscrpljene (agrometeorološka postaja Sliven).

Do sredine kolovoza, predviđene visoke temperature, s maksimalnim vrijednostima do 36-38°C, dovest će do skraćivanja interfaznih razdoblja u razvoju kasnih ratarskih usjeva. Vrijednosti ovog reda veličine, u kombinaciji s niskom vlagom zraka, imat će negativan utjecaj na cvatnju i oplodnju u povrtnim kulturama iz kasne ratarske proizvodnje.

Tijekom prve dekade kolovoza, raniji hibridi kukuruza završit će svoj razvoj, a srednje rani hibridi ući će u fazu mliječne zrelosti. Kod suncokreta u Podunavlju i južnim regijama uočiti će se faza zrenja. Krajem druge i početkom treće dekade u ratarskim regijama, suncokret će uglavnom biti u fazi tehničke zrelosti. Tijekom treće dekade, srednje kasni hibridi kukuruza ući će u fazu voštane zrelosti. U riži će se uočiti faza mliječne zrelosti, u soji - faza zrenja, a u pamuku - početak otvaranja čahura.

Vjerojatnost oborina, poboljšanja vodno-fizičkog stanja tla u gornjim slojevima i uvjeta za provođenje predviđene obrade površina namijenjenih sjetvi ozime uljane repice, predviđa se za drugu polovicu treće dekade. Agrotehnički rok sjetve uljane repice počinje u trećoj dekadi kolovoza.

U kolovozu se kod kasnih sorti voćaka ne smije podcjenjivati štetna aktivnost posljednje generacije voćnih crva. Relativno suho vrijeme tijekom većeg dijela mjeseca bit će preduvjet za povećanje populacija grinja. U vinogradima je potrebno pratiti pojavu i gustoću gusjenica treće generacije europskog grozdovog moljca. Prskanje za zaštitu bilja treba provoditi tijekom hladnijih sati dana proizvodima koji imaju odgovarajući rok čekaња do berbe, u skladu s razdobljem zrenja usjeva.

Izvor: NIMH