

Agrometeorološka prognoza za rujan

Автор(и): Растителна защита
Дата: 21.09.2020 *Брой:* 9/2020



I u rujnu će se agrometeorološki uvjeti u zapadnoj Bugarskoj značajno razlikovati od onih u istočnim regijama zemlje.

U istočnoj Bugarskoj oni će biti određeni iznadprosječnim temperaturama i ispodprosječnim oborinama. Na mnogim mjestima u istočnim regijama, kao rezultat dugotrajne ljetne suše, proljetni usjevi su prerano završili vegetaciju. U tim područjima, žetva suncokreta i ranijih hibrida kukuruza započela je ranije od uobičajenih rokova, s prinosima znatno ispod prosjeka zemlje.

U rujnu će se u većini zapadnih regija završne faze razvoja kasnih poljoprivrednih usjeva odvijati pod iznadprosječnim temperaturama, s oborinama blizu klimatskih normi i s dobrim zalihama vlage u tlu na kraju

ljeta u slojevima od 50 i 100 cm (preko 70% poljskog vodnog kapaciteta – Nikolaevo, Kyustendil, Sandanski) – kao rezultat iznadprosječnih oborina u kolovozu (Vidin – 67 l/m², Lom – 80 l/m², Sofija – 84 l/m², Kyustendil – 98 l/m², Blagoevgrad – 152 l/m², Sandanski – 107 l/m²).

Tijekom prve desetodnevne periode u rujnu, ponovno se predviđaju oborine agronomskog značaja za zapadnu polovicu zemlje. One će imati povoljan učinak na druge usjeve i kasne hibride kukuruza, koji će biti u fazi mliječne zrelosti. Tijekom ove desetodnevne periode, na poljskim površinama srednje kasni hibridi će ući u fazu voštane zrelosti. Do sredine mjeseca, dio kasnih hibrida završit će svoj razvoj. Tijekom druge desetodnevne periode, riža će biti u fazama voštane i pune zrelosti. Tijekom treće desetodnevne periode, faza sazrijevanja dogodit će se kod pamuka, kikirikija, jesenskih sorti voćaka i kasnijih sorti grožđa. Za mjesec, predviđene minimalne vrijednosti temperature su iznad kritičnih pragova za povrtne kulture, što je preduvjet za dobivanje dodatne povrtne proizvodnje iz kasnog poljskog uzgoja.

Većinu dana druge i treće desetodnevne periode očekuje se relativno suho vrijeme i uvjeti će biti pogodni za čišćenje površina od proljetnih usjeva.

I u rujnu će, u većem dijelu istočnih regija, nedostatak vlage u gornjim slojevima tla otežavati kvalitetno izvođenje duboke orbe i predsjetvene obrade tla na površinama predviđenim za sjetvu ozimog uljane repice i ozimih žitarica. Optimalni vremenski okvir za sjetvu uljane repice je do kraja druge desetodnevne periode mjeseca. U trećoj desetodnevnoj periodi, na poljima na višim nadmorskim visinama počinju agrotehnički rokovi sjetve za ječam i pšenicu.

Izvor: NIMH