

Topla i suha jesen nas očekuje u listopadu

Автор(и): Растителна защита
Дата: 06.10.2020 Брой: 10/2020



Početak jeseni, nakon duže suše, agrometeorološki uvjeti doživjeli su pozitivnu promjenu. Oborine, koje su u mnogim dijelovima zemlje premašile 20–30 l/m² (Vraca, Kneža, Oriahovo, Sofija, Dragoman, Kjustendil, Blagoevgrad, Sandanski, Kazanlak, Kardžali, Elhovo, Razgrad, Burgas), povećale su vlažnost u gornjim slojevima tla, što je od velike važnosti za pravilno provođenje sezonske obrade tla. Iznimke postoje u dijelovima Tračke nizine i u istočnim regijama, gdje oborine krajem rujna nisu imale gospodarskog značaja.

U listopadu agrometeorološke će uvjete određivati temperature iznad klimatskih normi i oborine ispod mjesečne norme.

Tijekom prvog desetljeća ne predviđaju se značajnije oborine te će u većini poljskih područja uvjeti omogućiti izvođenje predsetvene obrade tla i sjetvu jesenskih usjeva. Ove godine suša je otežala sjetvu ozimog uljane repice i velik dio planiranih površina bit će posijan u listopadu – nakon agrotehničkih rokova. Povećana je

vjerojatnost da kasnije posijani sastojci neće moći formirati rozetu (7–8 listova) do kraja svoje jesenske vegetacije, što je faza u kojoj uljana repica uspješno prezimljava.

Listopad je optimalno razdoblje za sjetvu ozimih žitatica. U prvoj polovici mjeseca je agrotehnički rok za sjetvu pšenice u sjevernoj Bugarskoj, u drugoj polovici – za južnu Bugarsku, a u trećem desetljeću – za područja uz crnomorsku obalu.

Tijekom prvog desetljeća, predviđene sezonski visoke temperature, s maksimalnim vrijednostima do 25–30°C, ubrzat će sazrijevanje kasnih sorti vinskog grožđa i osigurat će uvjete za dobivanje dodatne proizvodnje od povrtnih kultura kasne poljske proizvodnje.

Nakon neuobičajeno toplog vremena u drugoj polovici listopada, očekuje se postupna normalizacija toplinskih uvjeta. Predviđene oborine tijekom drugog i prve polovice trećeg desetljeća bit će od velike važnosti za normalan tijek početnih faza vegetacije posijanih jesenskih usjeva. Krajem listopada, ovisno o rokovima sjetve, u pšenici će se uočiti sljedeće faze: nicanje, treći list i početak klasanja u najranije posijanih sastojaka, posijanih početkom listopada.

Predviđene temperature iznad normale tijekom mjeseca stvorit će uvjete za povećanje populacije određenih štetnika – obične voluharice. U listopadu je potrebno pratiti jesenske usjeve i, kada populacija voluharica premaši prag ekonomske štete (2 aktivne kolonije po dekaru), potrebna je kontrola odobrenim rodenticidima (Phostoxin peleti) – otrovnim mamcima koji se postavljaju na ulaze u kolonije.

Većinu dana u mjesecu uvjeti će biti pogodni za berbu voća. U nasadima jabuka i krušaka pogođenim čađavom pegavošću, kako bi se smanjio inokulum, preporučljivo je, na početku opadanja lišća, nakon berbe plodova, provesti tretman s 5%-tnom otopinom uree.

Za koštuničavo voće, nakon masovnog opadanja lišća, preporuča se prskanje s 2%-tnom bordoачком smjesom protiv uzročnika rupičavosti lišća, rane smeđe truleži, kovrčavosti lišća breskve i sl.

Izvor: NIMH