

Zaštita bilja za vinovu lozu i voćne vrste u jesen

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 03.11.2020 Брой: 11/2020



Vrste voća

Jabuke i kruške

Većinu dana u listopadu uvjeti će biti pogodni za berbu voća. U nasadima jabuka i krušaka pogođenim paršom, kako bi se smanjila infekcija, preporučljivo je, na početku opadanja lišća i nakon berbe plodova, provesti tretman s 5%-tnom otopinom uree. Nakon temeljitog pregleda i otkrivanja kasnih infekcija, kao i protiv bolesti koje se razvijaju tijekom skladištenja proizvoda, provodi se tretman s Topsin M 70 WDG - 0,1% ili Top Plus 70 WP - 0,1%. Za dobro skladištenje jabuka i krušaka te za smanjenje truleži i propadanja tijekom skladištenja, također

se preporučuje izvesti jedan post-berbeni tretman s Topsin M 70 WG - 0,120%. Nakon prskanja, plodovi se ostave da se osuše, a zatim slažu u hladnjače ili duboke i prohladne podrumске просторе.

Koštuničavo voće

Za koštuničavo voće, nakon masovnog opadanja lišća, preporuča se prskanje s 2%-tnom bordoашком smjesom protiv uzročnika rupičavosti lišća, rane smeđe truleži, kovrčavosti lišća breskve i sl.

Pod ovim klimatskim uvjetima, okolina je također povoljna za pojavu i razmnožavanje višegodišnjih kukaca i grinja. Razvijaju svoje posljednje generacije, čija će gustoća populacije uvelike odreditи штету tijekom sljedeće godine. Tijekom mjeseca stvaraju se uvjeti za stvaranje obilne rose, što je uzrok kasnih infekcija plamenjače na kasnim rajčicama i drugima.

Vinogradi

Tijekom ovog razdoblja, siva plijesan (Botrytis trulež grozda) uzrokuje značajnu штету na vinovoj lozi od obojenja bobica pa sve do konzumacije. Stoga se, u vlažnom i hladnom vremenu, provodi tretman s Topsin M 70 WDG - 0,2%, Switch 62,5 WG – 100 g/ha, Shavit F 72 WDG – 0,2% (200 g/ha), Quadris 25 SC – 0,075%.

U to vrijeme također leti odrasla jedinka treće generacije grozdane savijače. Ličinke uzrokuju штету na bobicama grožđa koje sazrijevaju ili su već zrele. Za suzbijanje štetnika, u otopinu fungicida dodaje se registrirani piretroid.

Jednogodišnje loze se prekrivaju zemljom 3–5 cm iznad mjesta cijepljenja i tako se pripremaju za zimsku sezonu.

Sukladno Zakonu o zaštiti bilja, poljoprivrednici su dužni koristiti samo sredstva za заштиту bilja koja su odobrena за uporabu за određenu kulturu i štetnika, te u odgovarajućoj dozi.