

'Padaline i prikladni uvjeti za sadnju voćaka u studenom'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 11.11.2020 Брой: 11/2020



Nakon dugotrajne suše, iznadprosječne listopadske oborine, koje su na pojedinim mjestima u Sjevernoj Bugarskoj premašile 70-80 l/m² (N. selo - 72 l/m², Montana - 71 l/m², Knezha - 80 l/m², Pleven - 94 l/m², Lovech - 79 l/m², Dobrich - 75 l/m²), dovele su do značajnog povećanja zaliha vlage u gornjim slojevima tla i poboljšanja uvjeta za napredovanje početnih faza vegetacije posijanih jesenskih usjeva. Krajem listopada, na agrometeorološkim postajama Silistra, Knezha, Sofia, Kyustendil, Novachene, Nikolaevo, Pavlikeni, Borima, Kazanlak, Pazardzhik, Plovdiv, u sloju od 50 cm za ozime žitarine razine su dosegle do i iznad 75-80% poljskog vodnog kapaciteta.

U studenom će predviđene oborine, oko i iznad mjesečne norme, povećati jesenske zalihe vlage u sloju tla od 50 i 100 cm.

Tijekom prve polovice studenog, razvoj ozimih žitarina i ozime uljane repice odvijat će se umjerenim tempom, pri temperaturama blizu klimatskih normi. Tijekom tog razdoblja, kod pšenice će se, ovisno o rokovima sjetve, moći uočiti različite faze – nicanje, treći list i klasanje u ranije posijanim usjevima, krajem rujna i početkom listopada.

Krajem drugog desetljeća predviđa se zahlađenje i značajna promjena agrometeoroloških uvjeta. Na višim poljima, gdje oborine u obliku snijega nisu isključene, uočiti će se prestanak vegetativnih procesa u jesenskim usjevima.

Tijekom trećeg desetljeća studenog, razvoj usjeva u većini poljoprivrednih regija odvijat će se usporenim tempom, pri temperaturama blizu biološkog minimuma potrebnog za vegetaciju ozimih žitarina. Uvjeti za aktivnije vegetativne procese u pšenici, ječmu i ozimoj uljanoj repici stvorit će se u južnim i jugoistočnim regijama zemlje. Krajem studenog prevladavat će usjevi pšenice i ječma u fazi trećeg lista.

Ove godine je suša otežala pravovremenu sjetvu ozime uljane repice. Iz tog razloga, do kraja studenog samo će dio usjeva, uglavnom onih posijanih početkom jeseni, pokazivati početak faze formiranja rozete (5-6 listova).

U studenom su predviđene minimalne temperature, do minus 7°C, iznad kritičnih razina za jesenske usjeve koji su u početnoj fazi svog razvoja.

Povoljniji uvjeti za sadnju voćaka pojavit će se tijekom prve polovice mjeseca.

Izvor: NIMH