

Agrometeorološka prognoza za kraj studenog i početak prosinca

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.11.2020 Брой: 11/2020



Krajem studenog, zemlja se probudila pod snježnim pokrivačem. Sinoć je pao prvi snijeg ove sezone u zapadnoj Bugarskoj. Temperature su pale ispod nule, zbog čega su oborine u Sofiji, Razgradu, Perniku i Kyustendilu prešle u snijeg. Očekuje se da će snježni pokrivač doseći do 5 cm, osim u Podunavskoj nizini, gdje će njegova debljina biti između 10–15, a na nekim mjestima i do 20 cm.

Krajem studenog i početkom prosinca, agrometeorološki uvjeti bit će sve dinamičniji. Na početku razdoblja odredit će ih blago vrijeme za sezonu, s prosječnim dnevnim temperaturama u većini poljskih područja oko i iznad biološkog minimuma potrebnog za vegetaciju ozimih žitarica i ozime uljane repice.

Tijekom ovog razdoblja predviđa se značajan pad temperatura i promjena agrometeoroloških uvjeta. Očekivano hlađenje dovest će do usporavanja, a na višim poljima i Predbalkanu, gdje se predviđaju oborine uključujući snijeg, do prestanka vegetativnih procesa u jesenskim usjevima. Iznimke će se pojaviti na pojedinim mjestima u jugoistočnim regijama i duž obale Crnog mora, gdje će se uočiti slabo izražena vegetacija ozimih žitarica.

Početkom prosinca, u sjetvama pšenice zasijanima unutar agrotehničkog razdoblja, u listopadu, uočiti će se faza busanja, u kojoj ozime žitarice uspješno prezimljuju. Faza trećeg lista prevladavat će u sjetvama zasijanim početkom studenog. Kasno zasijane sjetve, sredinom studenog, nisu dobro uspostavljene i nalaze se u fazama nicanja i početnog formiranja listova. Kod uljane repice, faza rozete, prikladna faza za prezimljavanje, uočiti će se u sjetvama zasijanim početkom jeseni.

Tijekom sljedećeg razdoblja očekuju se oborine i poboljšanje zaliha vlage u tlu u gornjim slojevima tla. Kao rezultat ispodprosječnih oborina u studenom, zalihe vlage u tlu u slojevima od 50 i 100 cm u poljima pšenice u većem dijelu zemlje neuobičajeno su niske za ovu sezonu – na nekim mjestima u istočnim i krajnjim južnim regijama ispod 60% poljskog vodnog kapaciteta (agrometeorološke postaje Sandanski, Haskovo, Sliven, Razgrad).

Na početku sljedećeg razdoblja, uvjeti će biti pogodni za sadnju voćaka i za provođenje jesenskog prskanja za zaštitu bilja u voćnim nasadima.

Za zaštitu voćaka od zimskih hladnoća, za uništavanje lišajeva i mahovina, te za odbijanje smeđeg mramorastog stjeničara i leopard moljca, potrebno je tretirati debla i debele grane stabala s 20%-tnom vapnenom kašom u koju je dodana mala količina gline.

Izvor: NIMH