

Agrometeorološka prognoza na početku godine

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.01.2021 Брой: 1/2021



Iznadprosječne prosinačke temperature, s maksimalnim vrijednostima od 17-18°C na mnogim mjestima u nizinskim područjima (Kneža, Pleven, Loveč, Veliko Trnovo, Ruse, Silistra, Pazardžik, Plovdiv, Stara Zagora, Čirpan, Elhovo, Varna, Burgas), produžile su vegetativne procese u jesenskim usjevima. Neobično visoke temperature potaknule su prerano bubrenje pupova kod nekih ranocvatnih voćnih vrsta (breskva, trešnja), što će dovesti do smanjenja njihove otpornosti na hladnoću.

Tijekom prvog desetljeća siječnja, agrometeorološki uvjeti bit će određeni iznadprosječnim temperaturama. Na početku mjeseca, na mnogim mjestima u nizinskim područjima, njihove srednje dnevne vrijednosti ponovno će premašiti biološki minimum potreban za vegetaciju ozimih žitarica.

Hlađenje i prestanak vegetativnih procesa u jesenskim usjevima očekuju se tijekom druge polovice prvog desetljeća.

Tijekom drugog i trećeg desetljeća, predviđene temperature, bliske klimatskim normama, održavat će ozime žitarice i uljanu repicu u stanju mirovanja. Očekivani opsežan snijeg poboljšat će uvjete prezimljavanja jesenjih usjeva. Pšenica je ušla u zimu u različitim fenološkim fazama, kao posljedica produžene jesenske suše i odgođene sjetve. Kasno posijane ozime žitarice, sjetvene krajem jeseni, nisu dobro uspostavljene i nalaze se u fazama nicanja i ranog formiranja listova na nekim mjestima u južnim regijama zemlje (agrometeorološke postaje – Plovdiv, Haskovo, Ljubimets, Sliven, Jambol). Značajan dio sastojina pšenice prezimljavat će u fazi tri lista. U fazi busanja, koja je prikladna faza za prezimljavanje, nalaze se ozime žitarice posijane u optimalnom agrotehničkom razdoblju (agrometeorološke postaje – Bazovec, Novočane, Pavlikeni, Targovište, Sandanski, Pazardžik, Karnobat, Donji Čiflik).

U siječnju će predviđene minimalne temperature, do minus 15°C, u uvjetima bez snježnog pokrivača i uz dulje zadržavanje, biti kritične za neizbusane ozime žitarice i za sastojine ozime uljane repice koje nisu uspjele formirati rozetu tijekom svoje jesenske vegetacije.

Očekivane oborine u siječnju, oko i iznad norme, povećat će zalihe vlage u tlu u sloju od 100 cm. Iznadprosječne oborine u prosincu (Kardžali – 194 l/m², Haskovo – 142 l/m², Sliven – 125 l/m², Stara Zagora – 123 l/m², Silistra – 109 l/m²) naglo su povećale zalihe vlage u gornjim slojevima tla. Na početku zime, u poljima pšenice, zalihe vlage u tlu u sloju od 50 cm u većini nizinskih područja dosegle su razine iznad 85-90% poljskog vodnog kapaciteta (PVK).

U siječnju će prikladniji uvjeti za zimsko rezidbu vinograda i voćnjaka nastupiti tijekom trećeg desetljeća.

Izvor: DHMZ