

Agrometeorološka prognoza za veljaču

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.02.2021 Број: 2/2021



Tijekom prve dekade veljače, agrometeorološki uvjeti bit će određeni iznadprosječnim temperaturama, te će na mnogim mjestima u nizinskim područjima njihove prosječne dnevne vrijednosti doseći biološki minimum potreban za nastavak vegetativnih procesa u ozimim žitaricama.

Krajem prve i početkom druge dekade, očekuje se pad temperatura, što će spriječiti preuranjenu vegetaciju u jesen zasijanim usjevima i kod nekih ranocvatućih koštičavih vrsta voćaka u nizinskim regijama zemlje. Tijekom druge dekade, predviđene prosječne dnevne temperature bit će blizu klimatskih normi i održavat će poljoprivredne usjeve preko zime u stanju mirovanja.

Tijekom treće dekade, agrometeorološki uvjeti ponovno će biti određeni iznadprosječnim temperaturama, koje će poremetiti relativno mirovanje jesen zasađenih usjeva i prisilno mirovanje nekih ranocvatućih voćnih kultura. Krajem veljače, kod ozimih žitarica na pojedinim mjestima u južnoj Bugarskoj i duž obale Crnog mora, stvorit će se uvjeti za odgođenu vegetaciju, ali se ne očekuje značajna promjena u fenološkom statusu usjeva. Kod pšenice opažat će se treći list i faza busanja. U krajnje južnim i jugoistočnim regijama, kod nekih ranocvatućih koštičavih vrsta voćaka (badem, breskva, trešnja), doći će do bubrenja pupova, a na pojedinim mjestima i do početka pucanja pupova.

U veljači, predviđene vrijednosti minimalnih temperatura, do minus 12-13°C, u uvjetima bez snježnog pokrivača i uz dulje trajanje, predstavljat će rizik za kasno posijane ozime žitarice koje su zaustavile vegetaciju u fazi 2-3 lista, te za usjeve uljane repice koji nisu uspjeli formirati rozetu tijekom svoje jesenske vegetacije.

Očekivane oborine tijekom mjeseca, oko i iznad norme, povećat će zalihe vlage u dvometarskom sloju tla. Kao rezultat iznadprosječnih oborina u siječnju, koje su na mnogim mjestima u zemlji premašile 140-150 l/m² (Vraca -146 l/m², Šumen -147 l/m², Varna -154 l/m², Dragoman -158 l/m², Blagoevgrad -145 l/m², Sandanski -151 l/m², Haskovo -146 l/m², Kardžali -176 l/m², Elhovo -163 l/m², Burgas -185 l/m²), zalihe vlage u tlu u jednometarskom sloju kod ozimih žitarica dosegle su razine bliske poljskom vodnom kapacitetu (PVK).

Tijekom prve i druge dekade veljače, visok sadržaj vlage u gornjim slojevima tla ograničit će mogućnosti za provođenje nekih agrotehničkih aktivnosti – prihranjivanje jesen zasađenih usjeva dušičnim mineralnim gnojivima, predstajvena obrada površina namijenjenih sjetvi ranih jarih usjeva (grašak, grahorica, zob, jari ječam). Prikladniji uvjeti za rezidbu u vinogradima i voćnjacima, te za zimsko prskanje zaštite bilja u voćnjacima, bit će dostupni većinom dana prve i treće dekade veljače.

Izvor: NIMH