

Agrometeorološka prognoza za ožujak

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.03.2021 Брой: 3/2021



Nakon kratkotrajnog hladnog razdoblja početkom ožujka, tijekom većine dana prve polovice mjeseca agrometeorološki uvjeti bit će određeni temperaturama bliskim klimatskim normama i biološkom minimumu potrebnom za razvoj ozimih žitarica. Tijekom tog razdoblja, u južnim regijama zemlje stvorit će se uvjeti za početak vegetacije u jesen zasađenim usjevima.

Za drugu polovicu drugog desetljeća predviđa se značajan porast temperatura i aktivacija vegetativnih procesa u ozimim žitaricama i višegodišnjim nasadima.

Tijekom trećeg desetljeća razvoj poljoprivrednih kultura nastavit će se ubrzanim tempom, pod iznadprosječnim toplinskim uvjetima. Krajem mjeseca, pšenica i ječam bit će uglavnom u fazi busanja, s prijelazom na izdizanje

stabiljke u sastojinama u nekim južnim i jugoistočnim regijama zemlje. U ozime uljane repice, koja je prezimila u fazi rozete, masovno će se odvijati grananje.

U ožujku će se u voćnim vrstama moći uočiti različite fenološke faze – od bubrenja i pucanja pupova do faza zelenog grozda i cvatnje kod ranocvatućih koštičavih vrsta – badema, marelice, breskve, u južnim regijama i pojedinim mjestima u Podunavlju, gdje su iznadprosječne temperature u veljači izazvale prerani razvoj u voćnjacima.

U ožujku će predviđene minimalne temperature, do minus 7°C, predstavljati rizik za najnaprednije voćne vrste u fazama formiranja pupova i cvatnje.

Očekivane oborine u ožujku, blizu mjesečne norme, povećat će zalihe vlage u tlu čak i u dvometarskom sloju. Krajem veljače, u većini ratarskih regija zalihe vlage u tlu u jednometarskom sloju pod ozimim žitaricama bile su na razinama bliskim poljskom vodnom kapacitetu. Iznimke su uočene na pojedinim mjestima u Podunavlju – agrometeorološke postaje: Bazovets, Novachene, Pavlikeni, te u jugoistočnim regijama – agrometeorološke postaje: Sliven, Karnobat, Dolni Chiflik, gdje su zalihe vlage u tlu u jednometarskom sloju pod pšenicom bile ispod 90% poljskog vodnog kapaciteta.

U ožujku će tijekom većine dana prvog i tijekom druge polovice trećeg desetljeća biti povoljni uvjeti za provođenje sezonskih agrotehničkih radnji – predsjetvene obrade tla i sjetve ranih i srednje ranih jarih usjeva (grahorica, zob, jari ječam, grašak); preventivnih predcvatnih tretmana u voćnjacima protiv niza bolesti – plijesni u cvatu (rana smeđa trulež), rupičavost lišća, kovrčavost lišća breskve, parš, itd.

Predviđene česte oborine tijekom drugog i prve polovice trećeg desetljeća ožujka održavat će visok sadržaj vlage u gornjim slojevima tla i iz tog će razloga na pojedinim mjestima u južnim regijama agrotehnički rokovi za sjetvu suncokreta biti propušteni. Optimalno razdoblje za sjetvu suncokreta u južnoj Hrvatskoj javlja se između 15. i 20. ožujka, a u Podunavlju počinje sredinom trećeg desetljeća mjeseca (25.03–5.04).

Izvor: DHMZ