

Početkom travnja uočava se aktivno napredovanje vegetacijskih procesa u poljoprivrednim usjevima.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.04.2021 Брой: 4/2021



Unatoč očekivanom snježnom pokrovu u planinama i predviđenom hlađenju početkom travnja, agrometeorološke će uvjete određivati prosječne dnevne temperature koje će omogućiti aktivan tijek vegetacijskih procesa u poljoprivrednim usjevima. Početkom travnja ne predviđaju se kritične minimalne temperature za voćne vrste koje su uznapredovale u svom fenološkom razvoju.

Tijekom razdoblja, pšenica i ječam u južnoj Bugarskoj bit će u fazi izdizanja stabiljke. U usjevima u Podunavskoj nizini dogodit će se faza busanja, prijelaz u izdizanje stabiljke i početak izdizanja stabiljke. Za voćne vrste,

uočene fenološke faze bit će pucanje pupova, nalijevanje pupova i cvatnja. U vinovoj lozi dogodit će se protok soka i bubrenje pupova.

Tijekom razdoblja stvorit će se uvjeti za provođenje sezonskih agrotehničkih radova – sjetve suncokreta i predsjetvenih priprema tla za jare usjeve. U trajnim nasadima nastavit će se tretmani protiv parše u jabučastom voću, protiv uvenuća cvjetova (rana smeđa trulež) i rupičavosti lista u koštičavom voću, te kovrčavosti lista u breskvi. Za postizanje maksimalnog učinka prskanja, aktivnosti zaštite bilja treba provoditi po mirnom vremenu s dopuštenom brzinom vjetra do 2–3 m/s.

Predviđene oborine tijekom prvih dana razdoblja privremeno će ograničiti mogućnosti za provođenje agrotehničkih aktivnosti.

Izvor: NIMH