

Agrometeorološka prognoza za mjesec svibnja

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.05.2021 Брой: 5/2021



Ove godine, hladno vrijeme tijekom prve polovice proljeća odgodilo je razvoj poljoprivrednih usjeva. Tijekom većine dana u svibnju, agrometeorološki uvjeti bit će određeni nestabilnim vremenom.

Prognozirane iznadprosječne temperature početkom svibnja ubrzat će vegetativne procese u jesenskim sjetvama i posijanim proljetnim usjevima. Tijekom prve dekade, u pšenici će se javiti različite faze: izdizanje stabljike, prijelaz u klasanje i klasanje. U ječma u južnim regijama (Agrometeorološka postaja Sandanski) promatrat će se faza cvatnje. U uljane repice odvijat će se cvatnja, oplodnja i formiranje mahuna.

Nakon toplog vremena na početku mjeseca, za drugu polovicu prve dekade prognozira se normalizacija toplinskih uvjeta. Očekivane oborine tijekom tog razdoblja odgodit će provedbu nekih sezonskih agrotehničkih

aktivnosti – završetak sjetve kukuruza, predsjetvenu obradu tla i sjetvu kasnih termofilnih proljetnih usjeva (grah, pamuk, kikiriki, itd.).

Tijekom druge i treće dekade, razvoj poljoprivrednih usjeva odvijat će se umjerenim tempom, pri srednjim dnevnim temperaturama bliskim klimatskim normama. *Očekivane oborine u drugoj polovici svibnja održavat će vrlo dobru razinu zaliha vlage u slojevima tla od 50 cm i 100 cm, iznad 85% poljskog vodnog kapaciteta (PVK). To će imati povoljan učinak na ozime žitarice, u kojima će se odvijati formiranje i nalijevanje zrna. Krajem svibnja, u dijelu sastojina pšenice i ječma u južnim regijama, promatrat će se početak faze mliječne zrelosti.*

Tijekom mjeseca, u kukuruzu i suncokretu odvijat će se formiranje listova. Krajem svibnja, u suncokretu posijanom u agrotehničkom roku, promatrat će se formiranje cvata.

U voćnim kulturama odvijat će se formiranje i povećanje plodova. U vinove loze promatrat će se izbijanje cvasti, a krajem mjeseca – početak cvatnje – ove su faze kritične za infekciju plamenjačom.

Česte oborine u svibnju stvorit će uvjete za razvoj brojnih gljivičnih bolesti: rđe (smeđa, žuta) i septorioze u pšenici; plamenjače u povrtnim kulturama i vinovoj lozi; opadanje cvjetova, rupičavost listova i parš u voćaka, itd. Tijekom mjeseca, povoljniji uvjeti za provođenje tretmana zaštite bilja javit će se početkom prve, sredinom druge i početkom treće dekade.

U svibnju se ne prognoziraju kritične minimalne temperature za poljoprivredne kulture, ali vjerojatnost tuče ostaje povećana. U slučaju oštećenja od tuče, preporuča se da se oštećeni usjevi prilikom prve mogućnosti tretiraju fungicidima na bazi bakra radi bržeg zacjeljivanja rana i smanjenja rizika od sekundarnih infekcija.

Izvor: DHMZ