


Krajem svibnja – oborine od poljoprivredne važnosti u istočnim regijama zemlje

Автор(и): Растителна защита
Дата: 21.05.2021 Брой: 5/2021



Tijekom proteklog sedmodnevnog razdoblja, u većem dijelu poljoprivrednih područja, s izuzetkom nekih lokacija u istočnoj Bugarskoj, pala je ekonomski značajna količina oborina od preko 20–25 l/m². U nekim regijama sjeverne Bugarske – Knezha, Oryahovo, Lom – količine su premašile 40 l/m² i poboljšale vlažnost tla i uvjete za razvoj poljoprivrednih kultura.

Na početku sljedećeg razdoblja ponovno se predviđaju daljnje oborine, značajnije po količini u istočnim regijama zemlje, gdje se očekuje poboljšanje zaliha vlage u tlu u sloju od 50 cm. Vegetacijski procesi u ozimim i jarnim usjevima odvijat će se uobičajenim tempom uz temperature oko i iznad normale te uz dobru opskrbu vlagom. U pšenici će se odvijati faze cvjetanja, oplodnje i formiranja zrna, a u ječma u južnim regijama i početak faze

mliječne zrelosti. U ozimoj uljanoj repici odvijat će se formiranje mahuna i sjemena. U kukuruзу i suncokretu nastavit će se proces formiranja listova. U vinovoj lozi dogodit će se masovno odvajanje cvatova. U voćnih vrsta primijetit će se povećanje plodova.

Uvjeti za provođenje zaštitnih tretmana prskanjem protiv plamenjače u povrtnim kulturama i vinovoj lozi, te smeđe truleži u koštuničavom voću, pojavit će se sredinom razdoblja. Voćke oštećene tučom treba tretirati fungicidima na bazi bakra kako bi se ograničio razvoj gljivičnih bolesti.

Izvor: NIMH