

Agrometeorološka prognoza za lipanj

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.06.2021 Брой: 6/2021



Tijekom prve dekade lipnja, agrometeorološke uvjete odredit će nestabilno vrijeme. Na početku mjeseca predviđaju se značajne oborine i poboljšanje rezervi vlage u tlu u sloju od 50 i 100 cm. U većem dijelu zemlje, zalihe vlage u tlu za proljetne usjeve dosegnut će razine do, a u Podunavlju – čak i iznad 80-85% poljskog vodnog kapaciteta. Vlažnost tla ostat će niža u nekim istočnim i južnim regijama, gdje su oborine u svibnju bile manje, na pojedinim mjestima ispod 50-60% mjesečnih normi – G. Delchev, Sliven, St. Zagora, Varna, Karnobat, Burgas, Ahtopol.

Početkom lipnja, razvoj poljoprivrednih kultura odvijat će se sporijim tempom, pod hladnijim vremenskim uvjetima za ovo godišnje doba. Tijekom prve dekade, u pšenici će se odvijati nalijevanje zrna i faza mliječne zrelosti. Krajem dekade, u ječmu na pojedinim mjestima u južnim regijama, primijećivat će se i voštana zrelost –

Sandanski. Pljuskovi će ograničiti mogućnosti provođenja tretmana zaštite bilja protiv plamenjače u vinovoj lozi i povrtnim kulturama, proti šarže i smeđe truleži u voćnim stablima te protiv štitastog smrdljivca u ozimim žitaricama. Tijekom druge polovice razdoblja, vjerojatnost tuča i lokalnih oborina ostaje, što predstavlja rizik od oštećenja poljoprivrednih kultura. Rizik od poleganja usjeva pšenice i ječma je visok.

Tijekom druge dekade, predviđa se poboljšanje i normalizacija toplinskih uvjeta. Tijekom ove dekade, ječam će završiti svoj razvoj. U uljane repice, dogodit će se faza sazrijevanja.

Tijekom treće dekade, razvoj poljoprivrednih kultura odvijat će se pri temperaturama bliskim klimatskim normama. Tijekom ovog razdoblja, u pšenici u ravnici, primijećivat će se voštana zrelost.

Krajem lipnja, dio proljetnih usjeva ući će u reproduktivne faze svog razvoja. U ranih hibrida kukuruza, primijećivat će se faza metličanja, a u suncokreta sijanog u agrotehničkom roku – početak faze cvatnje.

Većinu dana u mjesecu, visoka atmosferska vlažnost održavat će povoljne uvjete za razvoj brojnih gljivičnih bolesti: šarža, rupičavost lišća i pepelnica u voćnim stablima; plamenjače u povrtnim kulturama i vinovoj lozi, itd. U vinovoj lozi, međufazno razdoblje od cvatnje cvasti do formiranja zametaka veličine graška ključno je za infekciju plamenjačom i pepelnicom (oidij). Prikladniji uvjeti za provođenje iznimno važnih tretmana zaštite bilja pojavit će se tijekom prve polovice druge i tijekom treće dekade lipnja.

Tijekom cijelog mjeseca, vjerojatnost tuča ostat će povećana. U slučaju štete od tuče, preporučljivo je da se oštećene voćne i povrtno kulture tretiraju fungicidima na bazi bakra pri prvoj prilici.

Izvor: DHMZ