

Krajem lipnja – visoke temperature i lokalne oborine

Автор(и): Растителна защита
Дата: 29.06.2021 *Брой:* 6/2021



Krajem lipnja, agrometeorološke će uvjete određivati toplo, a na pojedinim mjestima – vruće vrijeme. Razvoj poljoprivrednih kultura na većini poljskih površina odvijat će se uz dobre i vrlo dobre zalihe vlage u slojevima tla od 50 i 100 cm (preko 80–85% poljskog vodnog kapaciteta) kao rezultat obilnih oborina tijekom protekla dva tjedna, koje su na pojedinim mjestima u središnjoj i istočnoj Bugarskoj dosegle i premašile dvostruke lipanjske norme (Veliko Tarnovo – 118 l/m², Ruse – 115 l/m², Razgrad – 108 l/m², Silistra – 116 l/m², Dobrich – 111 l/m², Karnobat – 96 l/m²). Iznimke će se pojaviti u nekim krajnje zapadnim i južnim regijama, gdje je zabilježena ispodprosječna količina oborina, a zalihe vlage u tlu na početku ljeta nezadovoljavajuće su za proljetne usjeve u

sloju od 50 cm – ispod 65% poljskog vodnog kapaciteta (agrometeorološke postaje: Bazovets, Kyustendil, Sandanski, Haskovo, Sliven).

Tijekom tog razdoblja, suncokret će biti u fazi formiranja cvata. Početkom srpnja, u usjevima sijanih u agrotehničkom roku, uglavnom u južnim regijama, također će se uočiti početak faze cvatnje.

U kukuruza će se nastavljati formiranje listova. Kod ranijih hibrida uočiti će se faze metličanja i cvatnje metlice. Krajem lipnja i početkom srpnja, usjeve kukuruza treba pregledati na prisutnost jedne od najvažnijih štetočina – kukuruznog plamenca (*Ostrinia nubilalis*), a kada gustoća štetočina premaši ekonomski prag štetočnosti, hitno je potrebno izvršiti tretman.

Predviđene visoke temperature tijekom posljednjeg tjedna lipnja ograničit će razvoj brojnih gljivičnih bolesti, s izuzetkom pepelnice.

Tijekom sljedećeg razdoblja, pšenica će završiti svoj razvoj čak i na višim poljima.

Tijekom tog razdoblja, ponovno se predviđaju lokalne oborine, s povećanom vjerojatnošću u istočnoj Bugarskoj, gdje će početak žetvene kampanje biti dodatno otežan.

Izvor: NIMH