

U srpnju – vruće i suho vrijeme

Автор(и): Растителна защита
Дата: 23.07.2022 Брой: 7/2022



Tijekom drugog desetljeća srpnja, na poljoprivrednim površinama u zemlji nije zabilježena oborina od poljoprivrednog značaja. To je produbilo deficit zaliha vlage u tlu u jednometarskom sloju u zapadnoj i južnoj središnjoj Bugarskoj.

Krajem srpnja, agrometeorološke će uvjete određivati vruće i suho vrijeme. Temperature iznad normale s maksimalnim vrijednostima iznad 35°C, na pojedinim mjestima dosežući i prelazeći 40°C, poremetit će normalan tijek fizioloških procesa i dovesti do skraćivanja međufaznih razdoblja u poljoprivrednim kulturama. Tijekom tog razdoblja, ovisno o duljini vegetacijskog razdoblja pojedinih hibrida, kukuruz će biti u fazama metličanja, cvjetanja, svilanja, formiranja zrna, a na nekim lokacijama u Dunavskoj ravnici i u fazi mliječne zrelosti (agrometeorološke postaje Kneja, Novachene i Silistra).

U suncokretu će se odvijati cvjetanje, formiranje i punjenje sjemena. Vruće i suho vrijeme tijekom tog razdoblja zahtijevat će primjenu povećanih norma navodnjavanja za povrtne kulture i kukuruz.

Tijekom tog razdoblja, na mnogim mjestima u poljoprivrednim područjima, nedostatak vlage u oraničnom sloju otežat će i odgoditi pravilno provođenje sezonskih obrada tla.

U višegodišnjim kulturama i povrtnim kulturama nastavlja se prskanje za zaštitu bilja od bolesti i štetnika – protiv pepelnice i grozdovog moljca u vinogradima, protiv pepelnice, voćnih crva i grinja u voćnim vrstama, te protiv pepelnice i grinja u povrtnim kulturama. Prilikom kemijske zaštite treba primjenjivati proizvode s kratkim razdobljem čekanja do berbe, tijekom hladnijih sati u danu.

Izvor: NIMH