

U rujnu – dobra razina zaliha vlage i pogodni uvjeti za obavljanje sezonskih terenskih radova

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.09.2022 Брой: 9/2022



Tijekom prve polovice prve desetodnevnicе rujna, agrometeorološki uvjeti ostat će nestabilni, s čestim oborinama koje će održavati dobre rezerve vlage u gornjim slojevima tla na većini poljoprivrednih površina. Raširene oborine koje su pale tijekom treće desetodnevnicе kolovoza, premašivši u mnogim dijelovima zemlje 30-40 l/m² (Lom - 44 l/m², Oryahovo - 54 l/m², Knezha - 53 l/m², Plovdiv - 36 l/m², Kardzhali - 72 l/m², Chirpan - 67 l/m², Ahtopol - 60 l/m²), povećale su rezerve vlage u tlu u sloju od 50 cm. Ove su oborine bile prekasne za dio jarih usjeva uzgajanih u uvjetima navodnjavanja kišom, koji su, kao posljedica deficita vlage u tlu, prerano završili vegetaciju.

Tijekom prve i većeg dijela dana druge desetodnevnice rujna, razvoj kasnih poljoprivrednih usjeva koji su prevladali štetne učinke ljetne suše odvijat će se ubrzanim tempom, pri temperaturama oko i iznad klimatskih normi. Početkom rujna bit će završen razvoj srednje kasnih hibrida kukuruza. Kod kasnih hibrida promatrat će se stadij mliječne zrelosti, a sredinom mjeseca – stadij voštane zrelosti.

Početkom druge desetodnevnice ponovno se predviđaju oborine i očekuje se povećan rizik od razvoja patogena koji uzrokuju trulež zrelog i zrijućeg voća i grožđa - siva plijesan na grožđu, kasna smeđa trulež na plodovima jesensko-zimskih sorti voćaka.

Tijekom mjeseca, razdoblja s relativno suhim vremenom i povoljnijim uvjetima za obavljanje sezonskih poljskih radova: žetvu suncokreta i ranijih hibrida kukuruza, izvođenje duboke orbe i predsjetvene obrade površina predviđenih za sjetvu ozimih usjeva, te sjetvu ozime uljane repice, očekuju se tijekom druge polovice prve i većeg dijela dana druge desetodnevnice. Do kraja druge desetodnevnice rujna vrijedit će agrotehnički optimalni vremenski rokovi za sjetvu uljane repice.

Tijekom treće desetodnevnice rujna, predviđa se stabilizacija vremena, značajan pad temperatura i prijelazne promjene agrometeoroloških uvjeta tipične za kraj ljeta i početak jeseni. Predviđene oborine tijekom ovog razdoblja osigurat će vlagu za normalno nicanje sjetvenih sastojina ozime uljane repice posijanih unutar agrotehničkih rokova.

U stadiju nicanja, štetu na uljanoj repici uzrokuju repičina buha (odrasli jedinci) i repičina piljevina (lažne gusjenice), što zahtijeva nadzor nicalih sastojina na prisutnost ovih štetnika i, kada njihova gustoća prijede prag ekonomske štete (PES za repičinu buhu - 2 kukca po m²; PES za repičinu piljevinu - 2-3 lažne gusjenice po m²), potrebno je provesti pravovremenu zaštitu.

Do kraja rujna na poljoprivrednim površinama ne predviđaju se mrazevi, što će pružiti uvjete za stvaranje dodatne proizvodnje od povrtnih kultura kasne poljske proizvodnje.