


Krajem rujna i početkom listopada, uvjeti će biti povoljni za razvoj patogena koji uzrokuju trulež neubrane usjeva.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 25.09.2022 Брой: 9/2022



U rujnu je na pojedinim mjestima u južnim regijama (Haskovo, Pazardžik, Čirpan, Karnobat, Plovdiv, Sandanski, Sliven, Burgas) pala ekonomski značajna količina oborina od 15–20 l/m² koja je osigurala potrebnu vlagu za nicanje ozimog uljane repice sjetve u agrotehničkom roku.

Krajem mjeseca predviđa se poboljšanje agrometeoroloških uvjeta. Tijekom tog razdoblja kasni hibridi kukuruza završit će svoj razvoj i ući u punu zrelost. Kod kasnih sorti voćaka i vinograda procesi zrenja će se odvijati pri temperaturama oko klimatskih normi.

Tijekom razdoblja ne očekuju se značajnije oborine i uvjeti će omogućiti završetak žetve kasnih jarih usjeva, provedbu predsetvene obrade tla na površinama namijenjenim sjetvi pšenice i ječma, te primjenu mineralnih gnojiva. Tijekom razdoblja počinje agrotehnički rok za sjetvu ozimih žitarica na visokim poljima i Predbalkanu. Do kraja rujna uvjeti će omogućiti nadoknadu zakašnjenja u sjetvi ozime uljane repice. Razdoblje je pogodno za jesensku sjetvu špinata i za osnivanje novih nasada jagoda.

Početkom razdoblja, na izoliranim mjestima u kotlinskim poljima, ne može se isključiti mogućnost stvaranja mraza, što zahtijeva pravovremenu berbu proizvoda osjetljivih na oštećenja od mraza.

Tijekom prvog tjedna listopada agrometeorološke će uvjete određivati nestabilno vrijeme, a tijekom druge polovice razdoblja – također i temperature ispod normale. Predviđene oborine u prvom tjednu listopada odgodit će čišćenje površina od kasnih redovnih usjeva. Vlažno i prohladno vrijeme sredinom prve dekade bit će preduvjet za razvoj patogena koji uzrokuju trulež – sivu plijesan na neubranom usjevu kasnijih sorti vinskog grožđa, te kasnu smeđu trulež na plodovima jesensko-zimnih sorti voćaka.

Oborine koje su pale krajem rujna u sjeverozapadnim regijama, dijelu sjeveroistočnih regija i na sofijском polju, u rasponu od 20–30 l/m² (N. selo, Vidin, Lom, Orehovica, Sofija, V. Trnovo, Dobrič), povećale su zalihe vlage u gornjim slojevima tla. Tijekom sljedećeg razdoblja, u zapadnoj Bugarskoj i središnjim regijama, ponovno se predviđa vjerojatnost lokalnih, intenzivnih oborina, što će otežati provedbu predsetvene obrade tla na površinama namijenjenim sjetvi jesenskih usjeva. Očekuju se ozbiljna kašnjenja u sjetvi ozime uljane repice. Nepovoljni agrometeorološki uvjeti krajem ljeta i početkom jeseni, suša i naknadne intenzivne oborine, razlog su što je na mnogim mjestima u poljskim regijama propušten agrotehnički rok u rujnu za sjetvu uljane repice – kulture koja zahtijeva preciznu agrotehniku. Početkom listopada počinje agrotehnički rok za sjetvu pšenice u sjevernoj Bugarskoj.

Izvor: NIMH