

Treća dekada listopada – ograničavajući čimbenik za razvoj ozimih usjeva bit će nedostatak vlage u gornjim slojevima tla.

Автор(и): Растителна заштита

Дата: 25.10.2022 Брой: 10/2022



Tijekom prve polovice treće desetodnevnice listopada, agrometeorološke uvjete i dalje će određivati suho vrijeme i temperature iznad klimatskih normi.

U sjetvama pšenice i ječma zasađenim početkom mjeseca, odvijat će se faze klijanja, nicanja (agrometeorološke postaje Novachene i Pavlikeni) i početak formiranja listova, a kod ozimog uljane repice – formiranje listova. U mnogim regijama zemlje, ograničavajući čimbenik za razvoj sjetvi jesenskih usjeva bit će

nedostatak vlage u gornjim slojevima tla. Tijekom druge polovice razdoblja, započet će optimalni agrotehnički rokovi za sjetvu ozimih žitarica duž crnomorske obale.

Nedostatak rezervi vlage u tlu u obradivom sloju otežat će pravilno izvođenje duboke oranje strništa, pedsjetvene obrade tla i sjetve pšenice i ječma.

Vrijeme će biti pogodno za pregled sjetvi ozimih žitarica radi pojave i štetnog djelovanja određenih štetnika – voluharice, lisne zlatarice, žitnih muha i lisnih uši. Posebnu pozornost treba posvetiti područjima gdje se primjenjuje monokulturna proizvodnja.

Uvjeti će biti povoljni za provođenje fitosanitarnih mjera u trajnim nasadima – uklanjanje osušenih grana i mumificiranih plodova, struganje stare i ispucale kore te tretiranje jabučastog voća zahvaćenog čađavosti s 5%-tnom otopinom uree kako bi se ograničila infekcija.

Izvor: DHMZ