

Agrometeorološka prognoza za studeni

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.11.2022 Брой: 11/2022



Tijekom prve polovice studenog agrometeorološki uvjeti bit će određeni suhim vremenom i temperaturama iznad klimatskih normi. Do sredine mjeseca ograničavajući čimbenik za razvoj posijanih jesenskih usjeva i dalje će biti manjak vlage u tlu. U dijelovima južnih i jugoistočnih regija (agrometeorološka postaja Karnobat), nastala suša dovest će u pitanje preživljavanje dijela prokljajalih i nicanih usjeva.

Krajem listopada razina zaliha vlage u tlu u sloju od 50 i 100 cm bila je neobično niska, na mnogim mjestima u južnoj Bugarskoj – ispod 40% poljskog vodnog kapaciteta (agrometeorološke postaje: Plovdiv, Pazardžik, Sliven). U dijelovima jugoistočnih regija (agrometeorološka postaja Karnobat) nije bilo vlage u cijelom jednometarskom sloju tla.

Početak studenog suša će ograničiti provođenje sezonske obrade tla i, u nekim dijelovima poljoprivrednih površina, odgoditi sjetvu ozimih žitnica izvan agrotehničkih rokova.

Tijekom druge polovice studenog agrometeorološki uvjeti će se promijeniti. Od sredine druge do sredine treće dekade predviđaju se oborine, kao i poboljšanje zaliha vlage u tlu u gornjim slojevima i u uvjetima za napredak početnih faza vegetacije posijanih jesenskih usjeva. Tijekom tog razdoblja razvoj ozimih žitnica odvijat će se pri prosječnim dnevnim temperaturama bliskim klimatskim normama za drugu polovicu mjeseca.

Krajem studenog pšenica i ječam bit će u fazama nicanja i formiranja 1., 2. i 3. lista. Za mali dio usjeva na pojedinim mjestima u regijama Podunavske nizine (agrometeorološke postaje: Bazovec, Novachene, u regiji Ruse), gdje su lokalne oborine početkom jeseni osigurale vlagu za početnu vegetaciju ozimih žitnica, također će se uočiti faza busanja.

Tijekom mjeseca ne predviđaju se kritične minimalne temperature za nicalu jesenske usjeve. Početkom studenog mora se nastaviti s pregledom usjeva na prisutnost štetnika – pšeničnog minera, žitnih muha – i tamo gdje njihova gustoća prelazi ekonomski prag štetnosti (za žitne muhe EPŠ je 3–4 kom/m², za pšeničnog minera – preko 3 ličinke/m²), treba provesti pravovremenu zaštitu.

Povoljni uvjeti za provođenje jesenskog prskanja u voćnjacima radi suzbijanja infekcija parše, rane smeđe truleži, rupičavosti lišća, kovrčavosti lišća breskve i drugih prezimljavajućih patogena pojavit će se tijekom prve polovice studenog, a za sadnju voćaka – tijekom treće dekade.

Izvor: NIMH