

Prosinac – obratite pozornost na fitosanitarne aktivnosti u višegodišnjim usjevima

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.12.2022 Брой: 12/2022



Većinu dana u prosincu agrometeorološke uvjete određivat će dinamično vrijeme, s izmjenjivanjem kratkih razdoblja prosječnih dnevnih temperatura oko, ispod i iznad klimatskih normi.

Početak mjeseca povećani sadržaj vlage u gornjim slojevima tla ograničit će provedbu sezonskih obrada tla. Sredinom razdoblja ne očekuju se oborine, što će pružiti priliku za provođenje fitosanitarnih mjera u trajnim nasadima.

Hlađenje krajem studenog dovelo je do usporavanja, a na višim poljima i Predbalkanu, gdje se formirao snježni pokrivač, do prestanka vegetativnih procesa u jesenskim usjevima.

Početak prosinca predviđa se porast temperatura, ali njihove prosječne dnevne vrijednosti, s izuzetkom nekih lokacija u južnoj Bugarskoj i duž obale Crnog mora, neće premašiti biološki minimum potreban za vegetaciju ozimih žitarica.

Tijekom mjeseca, u većem dijelu zemlje, jesenski usjevi ostat će u stanju relativnog mirovanja. Iznimke će se ponovno primijetiti u usjevima u južnim i jugoistočnim regijama krajem prvog i tijekom prve polovice drugog desetljeća. Tijekom tog vremena predviđaju se temperature iznad normale, s maksimalnim vrijednostima iznad 10–12°C i uvjetima za odgođenu vegetaciju ozimih žitarica, ali promjena fenološkog stanja usjeva je malo vjerojatna.

Ove godine, značajan dio usjeva pšenice prezimiti će u početnoj fazi svog razvoja. Suša tijekom prve polovice jeseni u većem dijelu zemlje ograničila je i odgodila vegetaciju ozimih žitarica. Iz tog objektivnog razloga, usjevi će ući u zimu u različitim fenološkim fazama: nicanje, 1–2–3 lista i početak busanja. Samo mali dio usjeva pšenice na određenim lokacijama u Podunavskoj ravnici – agrometeorološka postaja Novachene i regija Ruse – nalazi se u fazi busanja, u kojoj usjevi najbolje podnose zimske uvjete.

U prosincu, predviđene minimalne temperature, do minus 9–10°C, u uvjetima bez snježnog pokrivača i uz dulje zadržavanje, predstavljat će rizik za niknule, ali još ne očvrsnute usjeve ozimih žitarica.

Očekivane oborine tijekom mjeseca, oko i iznad normale, povećat će razinu zaliha vlage u sloju tla od 50 i 100 cm. Nakon raširenih oborina u drugoj polovici studenog, koje su u mnogim dijelovima zemlje premašile 40–50 l/m², deficit vlage u jesenskim usjevima je prevladan.

Izvor: NIMH