

Veljača – vraća mirovanje u jesen posijanim usjevima i zaustavlja razvoj nekih vrsta koštičavog voća.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 05.02.2023 Брой: 2/2023



Hladni nalet krajem siječnja, nakon neuobičajeno visokih temperatura za to godišnje doba, vratio je stanje mirovanja u jesenskim usjevima i spriječio prerani razvoj kod nekih vrsta koštičavog voća.

U veljači će agrometeorološki uvjeti biti sve dinamičniji. Tijekom većine dana prvog desetljeća bit će određeni temperaturama ispod normale, ali bez kritičnih minimalnih vrijednosti za poljoprivredne usjeve koji prezimljuju. U većini dijelova zemlje, s izuzetkom jugoistočnih regija i crnomorske obale, predviđaju se snježne padaline, stvaranje snježnog pokrivača i poboljšanje uvjeta za prezimljavanje jesenjih usjeva.

Početak drugog desetljeća očekuje se zatopljenje i promjena agrometeoroloških uvjeta. Predviđene temperature do kraja veljače u većini poljskih područja bit će blizu klimatskih normi i održavat će ozime žitarice u stanju mirovanja. Iznimke se ponovno očekuju u južnim regijama i duž crnomorske obale. U tim regijama se tijekom drugog desetljeća predviđaju prosječne dnevne vrijednosti oko i iznad biološkog minimuma potrebnog za nastavak vegetativnih procesa u jesenjim usjevima. Krajem veljače, sastojine pšenice bit će u fazi trećeg lista i fazi busanja.

Tijekom mjeseca, predviđene minimalne temperature, u rasponu od minus 12-13°C, iznad su kritičnih pragova za ozime žitarice koje su ušle u fazu busanja. Ove vrijednosti, u uvjetima bez snježnog pokrivača, predstavljat će rizik za sastojine koje prezimljuju u fazi trećeg lista (agrometeorološke postaje: Kneja, Targovište, Kyustendil, Pazardžik, Chirpan, Sliven, Yambol, Dolni Chiflik).

Očekivane oborine u veljači, oko i iznad klimatskih normi, povećat će rezerve vlage u tlu u slojevima od jednog i dva metra. Značajne oborine tijekom drugog i trećeg desetljeća siječnja, na mnogim mjestima u zemlji iznad 60-70 l/m², a u nekim južnim regijama – iznad 120-130 l/m² (Haskovo-165 l/m², Kardzhali-214 l/m², Chirpan-133 l/m², Stara Zagora-144 l/m²), naglo su povećale razinu zaliha vlage u ozimim žitaricama. U većini poljskih područja, ukupna zaliha vode u jesenjim usjevima u jednodinarskom sloju tla dosegla je razine iznad 90% FC (poljskog vodnog kapaciteta).

U veljači će se prikladniji uvjeti za rezidbu u vinogradima i voćnjacima, te za provođenje zimskih zaštitnih tretmana u voćnjacima, pojaviti tijekom drugog desetljeća. Česte oborine tijekom mjeseca održavat će gornje slojeve tla previše vlažnima, što će otežati prihranu jesenjih usjeva dušičnim mineralnim gnojivima i provedbu predviđene obrade tla na površinama namijenjenim sjetvi ranih jarih usjeva (grašak, grahorica, zob, jari ječam).

Izvor: DHMZ