

Agrometeorološka prognoza za ožujak

Автор(и): Растителна защита
Дата: 14.03.2023 Брой: 3/2023



Klimatske anomalije tijekom druge polovice veljače, s neuobičajeno visokim maksimalnim temperaturama za to godišnje doba, koje su premašivale 21-22°C u mnogim nizinskim područjima (Kneža - 24°C, Loveč - 23°C, Pleven - 23°C, Plovdiv - 23°C, Čirpan - 23°C), dovele su do aktivacije vegetacijskih procesa u jesenskim usjevima i do preranog razvoja voćaka.

Tijekom prvog desetljeća ožujka, samo na nekim mjestima u južnoj Bugarskoj – Plovdiv, Pazardžik, Sandanski, Kardžali i Haskovo, zabilježene su gospodarski značajne oborine između 20-30 l/m2, što je dovelo do poboljšanja zaliha vlage u tlu za jesenske usjeve.

U središnjim i istočnim regijama temperature su bile iznad klimatskih normi i iznad biološkog minimuma potrebnog za vegetaciju ozimih žitarica.

Tijekom većine dana drugog desetljeća u nizinskim regijama zemlje predviđaju se temperature blizu uobičajenih za to razdoblje, kao i uvjeti za odgođenu vegetaciju ozimih žitarica.

Porast temperatura i aktivacija vegetacijskih procesa u jesenskim usjevima i višegodišnjim nasadima očekuje se tijekom prve polovice trećeg desetljeća. Krajem ožujka, stadij busanja prevladavat će u pšenici i ječmu.

Tijekom mjeseca, voćne kulture proći će kroz različite faze – od bubrenja i pucanja pupova do zelenog grozda, cvatnje i zamatanja ploda kod ranocvatnih koštuničavih vrsta (badem, marelica, breskva).

U ožujku se predviđaju minimalne temperature u rasponu od minus 5-10°C – vrijednosti kritične za cvjetove i mlade plodove voćaka.

Predviđene oborine tijekom mjeseca, oko i iznad norme, povećat će zalihe vlage u tlu u sloju od 100 cm. Kao rezultat ispodprosječnih oborina u veljači, razina zaliha vlage u tlu u slojevima od 50 i 100 cm kod ozimih žitarica u krajnje južnim i jugoistočnim regijama bila je neuobičajeno niska za to godišnje doba – na nekim mjestima ispod 55% poljskog vodnog kapaciteta (agrometeorološke postaje Sliven, Čirpan).

U ožujku će predviđeno dinamično vrijeme, s čestim oborinama, ometati provedbu sezonskih agrotehničkih aktivnosti. Povoljniji uvjeti za provođenje zaštitnih tretmana voćaka prije cvatnje nastupit će tijekom druge polovice prvog desetljeća. Tijekom mjeseca, povećani sadržaj vlage u gornjim slojevima tla ograničit će provedbu predviđene obrade tla na površinama namijenjenim sjetvi ranih i srednje ranih jarih usjeva. Iz tog razloga postoji vjerojatnost propuštanja optimalnih rokova sjetve suncokreta u južnim regijama.

Sredinom ožujka počinje agrotehnički rok (15.-20.03.) za sjetvu suncokreta u južnoj Bugarskoj, a sredinom trećeg desetljeća (25.03.–5.04.) – u Podunavskoj ravnici.

Gdje i kada u različitim regijama zemlje će postojati uvjeti za provođenje zaštitnih mjera na biljkama, pogledajte [OVDJE](#)

Izvor: NIMH